

A segunda quinzena de julho – tempo seco e quente

Автор(и): Растителна защита
Дата: 15.07.2023 *Брой:* 7/2023



Na segunda metade de julho, o desenvolvimento das culturas agrícolas prosseguirá em ritmo acelerado sob temperaturas acima do normal para a segunda década de julho.

Para o milho, dependendo da precocidade dos híbridos, serão observados diferentes estágios – formação de folhas, pendão, floração do pendão e emissão do estilo-estigma. No girassol, ocorrerão a floração e o enchimento de grãos. O consumo hídrico ativo das culturas e a ausência de precipitações de significado agrícola durante o período levarão a uma diminuição das reservas de humidade do solo. Em certas áreas do leste da Bulgária, será observada a depleção das reservas de humidade do solo na camada de 50 cm, o que exigirá a aplicação de um regime de irrigação apropriado.

As condições para a realização de pulverizações de proteção das plantas estarão presentes durante as horas mais frescas do dia, à noite e no início da manhã. Durante o período, devem continuar os tratamentos contra o oídio, a sarna e a traça-das-maçãs em pomares, e contra o oídio e a traça-da-uva em vinhas.

O tempo quente e seco previsto exige que a colheita de grãos seja realizada com cautela aumentada e em conformidade com as medidas agrotécnicas, a fim de prevenir o risco de incêndios em áreas agrícolas.

Fonte: NIMH