

Setembro – condições favoráveis para a formação de rendimento adicional em culturas hortícolas tardias

Автор(и): Растителна защита

Дата: 04.09.2023 *Брой:* 9/2023



Na maioria dos dias da primeira década de setembro, são previstas condições térmicas acima do normal, o que acelerará os estágios finais de desenvolvimento das culturas agrícolas tardias. Durante este período, os híbridos de milho de ciclo médio-tardio estarão nas fases de maturação cerosa e plena, enquanto os híbridos tardios estarão na fase de maturação leitosa e transição para a maturação cerosa.

No início da segunda década, as condições agrometeorológicas sofrerão uma mudança. Até meados da terceira década, elas serão determinadas por tempo instável e temperaturas próximas das normas climáticas.

Durante este período, são previstas precipitações de importância econômica que, após a seca acentuada, melhorarão as condições para a realização do preparo do solo pré-semeadura nas áreas destinadas ao plantio de culturas de outono. O final da segunda década de setembro é o momento agrotécnico ideal para a semeadura da colza de inverno.

Durante a segunda década, os híbridos tardios de milho também completarão seu desenvolvimento, e o arroz estará nas fases de maturação cerosa e plena. As frequentes chuvas previstas durante a segunda e a primeira metade da terceira década aumentarão o risco de desenvolvimento de patógenos que causam apodrecimento da produção de frutas e hortaliças em maturação – mofo cinzento em uvas (*Botrytis cinerea*), podridão parda tardia (*Monilinia fructigena*) nos frutos de variedades de outono-inverno de árvores frutíferas, requeima da batata (*Phytophthora infestans*) em tomates da produção tardia, etc.

Na segunda metade da terceira década, espera-se tempo seco e condições favoráveis para a colheita da safra de uvas. Como resultado das temperaturas de verão acima do normal, algumas das variedades de uvas para vinho mais tardias atingirão a maturidade tecnológica mais cedo do que as datas habituais.

No final de setembro, é aconselhável que os pomares de pereiras sejam inspecionados quanto à presença de uma praga perigosa – o gorgulho-das-gemas da pereira. O controle dessa praga é eficaz apenas contra os indivíduos adultos no início do outono. Se a densidade da praga exceder o nível de dano econômico (3 besouros por árvore), o tratamento é necessário.

Em setembro, não são previstas temperaturas mínimas críticas, e as condições permitirão a formação de produção adicional a partir de culturas hortícolas tardias suscetíveis à geada.

Fonte: NIMH