

Outubro – condições ideais para a sementeira de cereais de inverno e produção adicional de culturas hortícolas e variedades tardias de árvores frutíferas e uvas

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.10.2023 Брой: 10/2023



Em outubro, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas em torno e acima das normas climáticas e precipitação em torno e abaixo das normas mensais.

No início de outubro, a previsão de temperaturas acima do normal, com valores máximos de até 30-32°C, acelerará os processos de maturação em variedades tardias de fruteiras e videiras, e criará condições para a colheita de produção adicional de culturas hortícolas de produção de campo tardia (tomate, pimentão,

abobrinha, pepino). Como resultado das condições térmicas acima do normal, as variedades tardias de uvas para vinho tinto atingirão a maturidade tecnológica mais cedo do que as datas habituais, e as variedades de frutas de outono atingirão a maturidade de colheita.

Após o tempo relativamente seco e quente para a estação durante a segunda metade da primeira década, as condições agrometeorológicas sofrerão uma mudança. Durante este período, está prevista uma diminuição substancial das temperaturas mínimas, com condições para formação de geada em bacias e campos mais elevados, o que exigirá a colheita oportuna das culturas hortícolas suscetíveis a danos por geada (tomate, pimentão).

No final da primeira e início da segunda década, é esperada precipitação de importância econômica, uma melhoria das reservas de humidade do solo nas camadas superficiais do solo e das condições para a realização da preparação sazonal do solo. A seca no final do verão e início do outono em muitas partes do país, com exceção das regiões sudeste, atrasou a preparação pré-semeadura das áreas destinadas à semeadura com culturas de outono. Por esta razão, numa grande parte das regiões de campo, os prazos agrotécnicos em setembro para a semeadura da colza de inverno foram perdidos.



Outubro é o período ideal para a semeadura de culturas cerealíferas de inverno. Durante a primeira década é o prazo agrotécnico para a semeadura do trigo no Norte da Bulgária, de 15 a 25 de outubro no Sul da Bulgária, e no final do mês – ao longo da costa do Mar Negro.

Na maioria dos dias da segunda metade de outubro, as fases iniciais de vegetação das culturas de outono semeadas prosseguirão sob condições térmicas acima do normal. No meio e no final da terceira década, há uma previsão de probabilidade de precipitação, uma melhoria das reservas de humidade do solo na camada de 50 cm do solo e das condições para o desenvolvimento das culturas cerealíferas de inverno. No final de outubro, no trigo, dependendo das datas de sementeira, serão observadas as seguintes fases: emergência e formação de folhas (1-3 folhas).

As condições térmicas previstas para outubro, em torno e acima da norma, são um pré-requisito para o aumento da população do rato-do-campo – uma das pragas perigosas nas culturas de outono. No final do mês, as culturas de outono devem ser inspecionadas quanto à presença da praga, e onde a sua densidade exceder o limiar de dano económico (2 colónias ativas por decare), são necessárias medidas atempadas de proteção das plantas (iscos envenenados colocados nas entradas das colónias).

Em pomares de macieiras e pereiras, no início da queda das folhas, após a colheita dos frutos, recomenda-se a pulverização das árvores com uma solução de ureia a 5%. Este tratamento limita a infecção por sarna.

Para as espécies de frutas de caroço, contra o cancro bacteriano, a enrola das folhas do pessegueiro, a doença dos orifícios e a podridão castanha precoce no damasco, cerejeira-doce e ginja, após a queda massiva das folhas, deve ser realizada uma pulverização com uma calda bordalesa a 2%.

Fonte: NIMH