

# Durante a segunda metade de outubro, espera-se uma melhora na condição hidrofísica da camada superior do solo.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 16.10.2023 Брой: 10/2023



A ausência de precipitação durante a primeira e o início da segunda década de outubro levou a um aprofundamento da seca em curso. Na maioria das regiões aráveis do país, não há umidade produtiva na camada de solo de 50 cm, e em certas áreas do sudoeste da Bulgária (estação agrometeorológica de Kyustendil) – em toda a camada de um metro.

Após a previsão de tempo seco e sazonalmente quente até meados de outubro, durante a segunda metade da segunda década as condições agrometeorológicas sofrerão uma mudança. Durante este período, são

esperadas precipitações generalizadas, em alguns locais até 15-20 l/m<sup>2</sup>, uma melhoria do estado hidrofísico da camada superficial do solo e das condições para realizar a lavoura pré-semeadura atrasada das áreas destinadas à semeadura de culturas de inverno. Devido à seca, em muitos locais das regiões aráveis, os prazos agrotécnicos em setembro para a semeadura da colza de inverno foram perdidos. Também são esperados atrasos na semeadura das culturas cerealíferas de inverno. Em meados de outubro, expiram os prazos ótimos para a semeadura do trigo no norte da Bulgária. No período seguinte, começam os prazos agrotécnicos para a semeadura das culturas cerealíferas de inverno nas regiões sul do país.



A seca na Dobruja dificulta a preparação das áreas para a semeadura outonal do trigo. Os prazos ótimos para colocar as sementes da nova cultura são até o final de outubro, de acordo com os cientistas do Instituto Agrícola da Dobruja – General Toshevo.

O período de semeadura é altamente dependente das condições climáticas. Nos últimos anos, não tem sido incomum que a campanha de semeadura continue em novembro. Ao mesmo tempo, a condição das culturas depende muito de quais serão as temperaturas e a precipitação em novembro e dezembro e em que medida as plantas se endurecerão para sobreviver ao inverno.

A precipitação prevista durante a segunda metade do próximo período deve fornecer a umidade necessária para as fases iniciais da vegetação das culturas outonais. No final da segunda década de outubro, nas culturas

cerealíferas de inverno semeadas (estação agrometeorológica de Targovishte), a fase de germinação e a formação inicial das folhas estarão em andamento.

Condições favoráveis para completar a colheita da uva e para a colheita das variedades de frutas de outono ocorrerão no início e no final do período.

*Fonte NIMH*