

Em novembro, as condições serão favoráveis para a realização da aração sazonal do solo e da sementeira de outono atrasada.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 05.11.2023 Брой: 11/2023



Em novembro, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas e precipitação em torno e acima das normas climáticas.

A escassa precipitação e as temperaturas anormalmente altas em outubro levaram a um aprofundamento da seca existente. Em pleno outono, as reservas de humidade do solo na camada de 50 cm estão completamente esgotadas, e em parte das regiões aráveis a humidade produtiva está ausente em toda a camada de um metro do solo. Em muitas partes do país, devido às condições desfavoráveis, a preparação do solo pré-semeadura

das áreas destinadas à sementeira com culturas de outono foi adiada, e os prazos agrotécnicos para a sementeira das culturas cerealíferas de inverno foram perdidos.

Em caso de sementeira tardia, é geralmente recomendado aumentar a taxa de sementeira entre 5 e 10% para, na falta de afilhamento produtivo, manter o número de espigas por metro quadrado, de modo a preservar os rendimentos", partilha o Assistente Principal Alexiev do IRGR "K. Malkov" em Sadovo para Nivabg.com.

Durante a primeira década de novembro, espera-se uma mudança positiva gradual nas condições agrometeorológicas. No início do mês, está prevista precipitação, bem como uma melhoria na condição físico-hídrica da camada superior do solo e nas condições para realizar a preparação sazonal do solo e a sementeira outonal atrasada.

Precipitação de significado económico e um aumento nas reservas de humidade do solo na camada de 50 cm são esperados na segunda metade de novembro. Durante este período, as fases iniciais de vegetação das culturas outonais semeadas ocorrerão com temperaturas médias diárias acima do normal. No final de novembro, serão observadas diferentes fases no trigo e na cevada – desde a emergência até à 1ª, 2ª e 3ª folha.

Durante o mês, não são previstas temperaturas mínimas críticas para as culturas cerealíferas de inverno na fase de emergência.

Em novembro, condições mais adequadas para a plantação de árvores de fruto e para a realização de pulverizações de proteção fitossanitária outonal em fruteiras, visando limitar infeções de sarna, podridão castanha precoce, doença dos orifícios, enrolamento das folhas do pessegueiro e outros patógenos de invernção, ocorrerão durante a segunda década e no final do mês.

Fonte: NIMH