

Hora de plantar framboesas de outono

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.11.2023 *Брой:* 11/2023



A framboesa tem uma série de vantagens sobre outras espécies frutíferas – floresce mais tarde, não sofre com as geadas da primavera e frutifica todos os anos. Seus frutos são saborosos, nutritivos, com boas propriedades medicinais. Eles fortalecem a atividade cardíaca, enriquecem o organismo com vitaminas e substâncias minerais e aumentam o apetite. São conhecidos pelo seu efeito antipirético, devido à presença de ácido salicílico.

A escolha do local para o plantio da framboesa é feita de acordo com as exigências da cultura em relação às condições climáticas e de solo. O preparo do solo pré-plantio inclui aração a 30–35 cm, gradagem rasa para incorporação dos fertilizantes e cultivo. Aplica-se esterco de curral.

O período mais adequado para o plantio é do final de outubro até o início do tempo frio. O plantio também é possível na primavera – até o final de março. O espaçamento entre as fileiras é de 1,8–2 m. O plantio é feito manualmente em sulcos com profundidade de cerca de 35 cm.

Novos plantios são fertilizados com 8–10 kg/da de nitrogênio, e os em frutificação com 8–12 kg/da. Em solos mais pesados, o nitrogênio é aplicado uma vez, no início da primavera, e se forem mais leves, no início da primavera e no final de maio. A adubação de cobertura dos plantios em frutificação é realizada após a floração. Se a precipitação for insuficiente, aplica-se irrigação conforme necessário até meados de agosto. A poda é realizada todos os anos, durante a qual os ramos frutíferos de 2 anos são removidos e os ramos de 1 ano são desbastados. No segundo ano após o plantio, deixam-se 2–3 ramos por planta para frutificação e os demais são cortados rente ao solo. No terceiro e quarto ano, o número de ramos frutíferos aumenta e os plantios entram em plena frutificação. Na primavera, a poda é realizada no inchamento das gemas, removendo-se aquelas danificadas por geadas de inverno, doenças e pragas.

Cuidados com os semi-arbustos frutíferos durante o verão

As framboesas são danificadas pelas doenças didimela, cancro dos ramos, ferrugem, antracnose, e entre os vírus – mosaico e clorose das nervuras. As pragas mais comuns da framboesa são o besouro-da-framboesa, pulgões, Agrilus, mosca-da-galha-da-framboesa e mosca-das-galhas-da-framboesa.



Na Bulgária, as seguintes cultivares de framboesa são as mais amplamente distribuídas:

Lyulin – os frutos amadurecem de 27 de agosto a 3 de outubro. São grandes, vermelho-intenso, brilhantes, firmes, com sabor muito bom e aroma moderado. As plantas são vigorosas e de crescimento moderado. A cultivar é altamente produtiva e pode ser cultivada sem estrutura de suporte.

Willamette – uma cultivar americana moderadamente produtiva. Os frutos amadurecem no período de 6 a 8 de julho. São de tamanho médio, cônicos, com sementes pequenas. Têm um bom sabor doce-ácido e aroma. As plantas têm crescimento moderado e são cultivadas em regiões mais frias sob condições de irrigação.

Bulgarski Rubin (Rubi Búlgaro) – os frutos amadurecem no período de 28 a 30 de junho. São de tamanho médio, ligeiramente cônicos, vermelho-rubi, não se desfazem em drupéolas individuais e têm um sabor doce-ácido agradável e aroma moderado. A cultivar é altamente produtiva.

Shopska Alena – os frutos amadurecem no período de 3 a 5 de julho. São de médios a grandes, cônicos-rombos, vermelho-vivo, com brilho moderado e sementes pequenas. Desprendem-se facilmente, com sabor doce-ácido muito bom e aroma moderado. São adequados para processamento e congelamento. As plantas são de crescimento forte, ligeiramente cobertas com espinhos finos. A cultivar é altamente produtiva.

