

Dezembro – de temperaturas sazonais acima da média ao restabelecimento da dormência relativa nas culturas de outono

Автор(и): Растителна защита

Дата: 04.12.2023 Брой: 12/2023



Após a queda acentuada das temperaturas no final de novembro, que levou à desaceleração e cessação da vegetação nas culturas de outono na maioria das áreas de campo, no início de dezembro as condições agrometeorológicas sofrerão uma mudança substancial.

Durante os primeiros dias do mês, prevê-se um aumento das temperaturas e os valores médios diários nas regiões sul e ao longo da costa do Mar Negro subirão acima do mínimo biológico necessário para a vegetação das culturas de cereais de inverno.

No início de dezembro, as condições agrometeorológicas no leste da Bulgária diferirão significativamente das do resto do país. Nas regiões orientais, são previstas temperaturas mais altas do que o habitual para a estação, com valores máximos de cerca de 17°C-18°C e valores médios diários significativamente acima do mínimo biológico necessário para a vegetação das culturas de cereais de inverno.

Uma queda nas temperaturas e a restauração da dormência relativa nas culturas de outono são esperadas durante a segunda metade da primeira década do mês.

Durante a maioria dos dias da segunda e terceira décadas, as condições agrometeorológicas serão dinâmicas, com alternância de curtos períodos de temperaturas médias diárias em torno e acima das normas climáticas, mas dentro de faixas que manterão as culturas de cereais de inverno em dormência na maioria das áreas de campo do país. Exceções são mais uma vez esperadas nas regiões mais ao sul, onde durante os períodos relativamente mais quentes serão criadas condições para uma vegetação tardia e de curto prazo nas culturas semeadas no outono, mas isso não levará a uma mudança substancial no estado fenológico das lavouras.



Este ano, a prolongada seca do outono atrasou a semeadura do trigo e uma grande parte das lavouras foi semeada em novembro, após os prazos agrotécnicos. Por esta razão, as lavouras de novembro entrarão no inverno na fase de emergência e de 1-2 folhas. Nas culturas de cereais de inverno semeadas em outubro, predominarão lavouras na fase de três folhas no início do inverno.

Em dezembro, os valores previstos de temperaturas mínimas, de até menos 9-10°C, em condições sem cobertura de neve e com uma duração mais prolongada, representarão um risco para as lavouras tardias de novembro que emergiram e ainda não endureceram.

A precipitação prevista durante o mês estará próxima das normas climáticas e aumentará os níveis de reservas de humidade do solo, mesmo nas camadas mais profundas do solo. Após as chuvas generalizadas de chuva e neve durante a terceira década de novembro, que em muitas partes do país excederam 50-60 l/m², e em parte da Planície do Danúbio 80-90 l/m², ocorreu um aumento nas reservas de humidade do solo na camada de 100 cm e o défice de humidade nas culturas de outono foi superado.

A precipitação esperada durante o período manterá um alto teor de humidade nas camadas superficiais do solo e condições desfavoráveis para a realização de trabalhos sazonais de preparo do solo e atividades fitossanitárias em pomares.

Fonte: NIMH