

Janeiro começa com temperaturas excepcionalmente altas

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.01.2024 Брой: 1/2024



As anomalias climáticas no início do inverno, com temperaturas excepcionalmente altas superando 20–21°C em muitos locais, levaram a um reinício dos processos de vegetação nas culturas de outono em partes das regiões aráveis do país. O tempo anormalmente quente causou, em algumas das regiões extremas do sudoeste, um inchaço prematuro e indesejado das gemas em certas espécies de arbustos e frutíferas de floração precoce, como a cornideira, o damasqueiro, o pessegueiro e a cerejeira.

No início de janeiro, as condições agrometeorológicas continuarão a ser determinadas por temperaturas acima do normal e valores médios diários nas regiões aráveis acima do mínimo biológico necessário para a ocorrência de vegetação retardada nas culturas de cereais de inverno.

Durante a segunda metade da primeira década do mês, está prevista uma diminuição das temperaturas e uma mudança nas condições agrometeorológicas. O resfriamento esperado durante este período terminará a vegetação tardia dos cereais de inverno e dificultará o desenvolvimento intempestivo de algumas espécies arbóreas, o que, de outra forma, levaria a uma redução na sua resistência ao inverno. Durante a segunda e terceira décadas, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas próximas das normas climáticas, o que manterá os cereais de inverno em estado de dormência.

Em janeiro, as lavouras de trigo e cevada passarão o inverno em diferentes estágios fenológicos. Os cereais de inverno semeados tardiamente no final do outono, nas estações agrometeorológicas de Băzovec, Nikolaevo, Kazanlăk, Sliven e Chirpan, estão na fase de emergência e no estágio inicial de formação de folhas. Nas lavouras semeadas em novembro em Kneža, Tărgoviște, Pazardžik, Haskovo e Ljubimec, predomina o estágio de terceira folha. Uma pequena parte das lavouras de trigo e cevada em alguns locais da Planície Danubiana – estação agrometeorológica de Novachene – e na Planície Trácia Superior na região de Plovdiv estão na fase de perfilhamento, que é a fase apropriada para a hibernação. Em janeiro, as temperaturas mínimas previstas, de até menos 13°C, não representarão risco para as culturas permanentes e para os cereais de inverno que entraram na fase de perfilhamento. Em condições sem cobertura de neve, valores na faixa de menos 10–13°C, se persistirem por um período mais longo, serão críticos para as lavouras estabelecidas tardiamente e de forma deficiente. A precipitação prevista para janeiro, em torno e acima da norma, aumentará as reservas de humidade do solo nas camadas de um metro e dois metros. No final de dezembro, as reservas de humidade do solo para o trigo na camada de um metro na maioria das regiões aráveis estavam acima de 85–90% da capacidade de campo (CC).

Durante o mês, condições mais adequadas para realizar a poda de inverno das espécies de frutas de pomóideas ocorrerão no início da primeira e durante a maioria dos dias da terceira década do mês.

Fonte: NIMH