

Fevereiro – condições agrometeorológicas com dinâmica acentuada

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.02.2024 Брой: 2/2024*



Em fevereiro, as condições agrometeorológicas serão altamente dinâmicas, com períodos alternados de temperaturas acima do normal e valores dentro e abaixo das normas climáticas para o mês.

Durante a maioria dos dias da primeira década, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas elevadas para a estação. Os valores médios diários previstos nas regiões aráveis do país atingirão e excederão o mínimo biológico necessário para o reinício dos processos vegetativos nas culturas de cereais de inverno. As temperaturas previstas, elevadas para a estação durante a segunda metade da primeira década de fevereiro, com valores máximos na faixa de 15-20°C, desencadearão um desenvolvimento

premature em algumas espécies de frutas de caroço de floração precoce (amendoeira, damasqueiro, pessegueiro) nas regiões sul e sudeste do país.

No final da primeira e início da segunda década, as condições agrometeorológicas sofrerão uma mudança. A onda de frio esperada inibirá a vegetação das culturas de outono e o desenvolvimento prematuro e indesejado das árvores frutíferas.

Durante a segunda metade de fevereiro, as temperaturas médias diárias previstas na maior parte do país estarão dentro de faixas que restringirão o desenvolvimento das culturas agrícolas em hibernação. Exceções serão observadas nas regiões extremas sul e sudeste, onde, no final do mês, serão criadas condições para o início de uma vegetação atrasada nas culturas de outono, mas não é esperada uma mudança substancial nos estágios fenológicos das culturas. No final de fevereiro, as lavouras de trigo no estágio de crescimento da terceira folha predominarão.

Durante o mês, as temperaturas mínimas previstas, de até -12°C, estão acima dos limites críticos para as lavouras de trigo em hibernação nos estágios de terceira folha e perfilhamento. Em condições sem cobertura de neve e com persistência mais prolongada, esses valores representarão um risco para as culturas de cereais de inverno de semeadura tardia que estão no estágio inicial de formação de folhas (1-2 folhas).

A precipitação esperada em fevereiro, em torno e acima da norma, aumentará as reservas de umidade do solo do outono-inverno também na camada de dois metros do solo. No final da segunda década de janeiro, as reservas de umidade do solo para o trigo na camada de um metro na maior parte do país, com exceção de alguns locais nas regiões orientais (Razgrad, D. Chiflik, Chirpan, Sliven), estavam em níveis acima de 90% da capacidade de campo.



Durante o mês, condições mais favoráveis para a realização de atividades agrotécnicas sazonais — poda em vinhedos e pomares, pulverização de inverno de árvores frutíferas com fungicidas à base de cobre, adubação de cobertura das culturas de outono com fertilizantes minerais nitrogenados, preparo pré-semeadura de áreas destinadas ao plantio com culturas de primavera precoce (ervilha, ervilhaca, aveia, cevada de primavera) — ocorrerão na maioria dos dias da primeira década e na segunda metade da segunda década.



Em fevereiro, os campos de trigo devem ser monitorados quanto à presença de uma praga perigosa – o rato-do-campo, e onde sua densidade exceder o limite econômico de dano (LED – 1 colônia ativa por decares), medidas oportunas de proteção de plantas com rodenticidas autorizados para esse fim são imperativas.

fonte NIMH