

No final de fevereiro – condições adequadas para o cultivo do solo de campos destinados à sementeira com culturas de primavera, poda e pulverização de proteção de plantas em culturas permanentes

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.02.2024 *Брой:* 2/2024



No final de fevereiro, as condições agrometeorológicas continuarão a ser determinadas por temperaturas médias diárias acima do mínimo biológico necessário para a retomada e progressão dos processos vegetativos nas culturas de cereais de inverno. No final do período outono-invernal de acumulação de humidade, as

reservas de humidade do solo na camada arável de um metro variam entre 70% e 90% da capacidade de campo (CC).

Durante o período, nas searas de trigo e cevada de sementeira tardia com desenvolvimento atrasado, será observado o estágio de crescimento da terceira folha. O estágio de afilhamento será observado nas searas da Planície do Danúbio e em locais isolados nas regiões sul do país – estações agrometeorológicas de Băzovec, Knezha, Novachene, Nikolaevo, Dolni Chiflik, Targovishte, Silistra, Lyubimets, Plovdiv, Pazardzhik, Kyustendil e Sandanski. Nas espécies de fruteiras de caroço, ocorrerá o inchaço das gemas.

Zabro – Zabrus tenebrioides

Durante a maioria dos dias do período, com exceção de alguns locais nas regiões ocidentais onde se prevê precipitação, as condições serão adequadas para: preparo do solo em campos destinados à sementeira com culturas de primavera; poda e pulverizações de proteção fitossanitária em culturas permanentes; inspeção das searas de trigo e cevada para verificar a presença e a atividade nociva do rato-do-campo comum e das larvas do zabro. Tendo em vista a retomada da vegetação nas culturas de cereais de inverno, deve ser dada prioridade à conclusão da adubação nitrogenada das searas.

Fonte: NIMH