

Durante o terceiro decêndio de março – risco de geada

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.03.2024 *Брой:* 3/2024



No final da segunda e início da terceira década de março, em muitos locais das áreas de campo do país, foram criadas condições para a formação de geadas, que causaram danos de graus variados às flores das árvores frutíferas.

Durante o próximo período de sete dias, as condições agrometeorológicas serão novamente determinadas por um tempo dinâmico. São previstas temperaturas médias diárias acima do mínimo biológico necessário para o curso dos processos vegetativos nas culturas de outono-inverno. No trigo e na cevada, a fase de perfilhamento prosseguirá. Apenas em locais isolados das regiões sul do país será observada a fase de alongamento do colmo.

De acordo com dados do Instituto Agrícola da Dobrudja (IAD) - General Toshevo, de outubro de 2023 até o final de fevereiro, o total de precipitação foi de 205 litros por m². No entanto, durante os primeiros dois meses de 2024, caiu um total de 22 litros por m². Ao mesmo tempo, foram registradas altas temperaturas acima de 16°C e, em alguns lugares, até 19,6°C. Sob estas condições, o trigo geralmente não entra em dormência.

Nos últimos anos, durante o mês de abril, temos testemunhado fenômenos que já se tornaram comuns – quedas bruscas de temperatura com baixas temperaturas e geadas. O frio da primavera, combinado com a seca, pode ter um impacto sério no trigo.

Em campos individuais, observa-se a presença de septoriose, mas ainda é cedo para o tratamento com fungicidas, informou o Prof. Ivan Kiryakov, PhD do IAD, ao Agri.bg. No final de março, uma comissão formada pela Direção Regional de Agricultura irá inspecionar os campos de trigo na região de Dobrich para determinar a condição das culturas, seus estágios de desenvolvimento e quaisquer problemas potenciais a serem abordados nas áreas de cereais.

Nas culturas permanentes, ocorrerão várias fases fenológicas – desde o inchaço e abertura das gemas até a formação do botão floral, floração e brotação. Durante os primeiros dias do período, são previstas geadas e temperaturas mínimas negativas, o que representará um risco para as culturas frutíferas que estão avançadas em seu desenvolvimento.

A precipitação esperada na segunda metade do período limitará as oportunidades para trabalhos de campo. Condições mais adequadas para a realização de atividades agrotécnicas sazonais – preparo pré-plantio do solo e semeadura de girassol, bem como pulverização de defensivos agrícolas nas culturas, estarão disponíveis no início do período. Os tratamentos devem ser realizados com tempo calmo e a uma velocidade do vento de até 2-3 m/s. Durante o período, começa a janela agrotécnica ideal para a semeadura de girassol no Norte da Bulgária.

Fonte: NIMH e Agri.bg