

No final de abril e início de maio – tempo instável com risco de formação de geada e danos às culturas agrícolas

Автор(и): Растителна защита

Дата: 29.04.2024 *Брой:* 4/2024



Durante o próximo período de sete dias, os processos de vegetação das culturas agrícolas prosseguirão a taxas moderadas com temperaturas diárias médias em torno das normas climáticas. A chuva economicamente significativa durante o terceiro decêndio de abril nas regiões de campo do país melhorou as condições para as fases iniciais de desenvolvimento do milho e girassol e para a vegetação de cereais de inverno.

Em alguns locais em Plovdiv, Stara Zagora e Sliven, ocorreram tempestades de granizo, destruindo grande parte da colheita. Todas as plantações de rosas na aldeia de Banya, em Sliven, foram destruídas pelo granizo,

e os vinhedos também foram afetados.

Durante o período para o trigo e a cevada, ocorrerão as seguintes fases: alongamento do colmo em algumas das culturas na metade ocidental do país e na parte central da Planície do Danúbio; transição para o espigamento e espigamento em algumas áreas da Bulgária Oriental e Meridional – estações agrícolas Targovishte, Silistra, Karnobat, Kazanlak, Plovdiv e Pazardzhik. Para o milho e girassol, ocorrerá a emergência e o início da formação de folhas, dependendo das datas de semeadura.

Para as videiras, será observada a formação de folhas (1-3 folhas) e a separação dos cachos.

Para os cereais de inverno durante as fases de alongamento do colmo e espigamento, os danos às plantas são causados pelo gorgulho-das-folhas-dos-cereais e pelo percevejo-dos-cereais. As culturas também devem ser inspecionadas quanto ao desenvolvimento de oídio.

Para as espécies frutíferas, após a floração, os tratamentos continuam contra a podridão parda precoce em frutas de caroço, sarna e oídio em frutas de pomóideas. Para as videiras, as pulverizações fitossanitárias visam proteger a cultura do míldio e oídio e da atividade prejudicial do ácaro amarelo da videira.

O tempo instável previsto com precipitação limitará temporariamente as possibilidades de realização de atividades agrotécnicas. No início do período, nas planícies altas da Bulgária Ocidental, permanece a probabilidade de formação de geada e danos às culturas agrícolas.

Fonte NIMH