

Maio – tempo instável e condições para um aumento no nível de infecções fúngicas

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.05.2024 Брой: 5/2024



Durante a maioria dos dias do primeiro decêndio de maio, as condições agrometeorológicas serão determinadas por um tempo instável com chuvas frequentes, o que criará condições para o aumento do fundo infeccioso de doenças fúngicas. Os processos vegetativos nas culturas agrícolas prosseguirão a taxas moderadas, com temperaturas próximas às normas climáticas.

A chuva na segunda quinzena de abril na maioria das áreas de campo, entre 30-50 l/m², contribuiu para a superação do déficit de humidade do solo nas culturas de outono, com exceção de alguns locais no Noroeste da Bulgária. A chuva prevista até meados de maio manterá reservas de humidade relativamente boas na

camada de solo de 50 cm, acima de 75% da CC (Capacidade de Campo). Durante o primeiro decêndio, as culturas de trigo passarão pela fase de espigamento – início e massa. A colza estará em flor.

As condições mais adequadas para a realização de atividades agrotécnicas sazonais e pulverizações fitossanitárias durante o primeiro decêndio serão no meio do período, quando é previsto tempo relativamente seco.



O escaravelho-das-folhas-do-cereal comum ameaça seriamente os rendimentos do trigo

Durante o período, as culturas de cereais de inverno devem ser inspecionadas quanto à presença e densidade do percevejo do cereal nocivo e do escaravelho-das-folhas-do-cereal comum.



Nas videiras, os danos aos cachos de flores são causados pelas lagartas da primeira geração da traça-do-cacho da uva. Ao atingir o limiar de dano econômico (LDE), que é de 6-8 lagartas por 100 cachos para variedades de vinho e 4-6 lagartas por 100 cachos para variedades de mesa, o tratamento oportuno é obrigatório.

Após o tempo instável até meados do mês, uma mudança nas condições agrometeorológicas é esperada na segunda quinzena de maio. Prevê-se um aumento das temperaturas médias diárias e uma aceleração dos processos vegetativos nas culturas de outono e nas culturas de primavera semeadas. Durante este período, ocorrerá a formação de folhas em girassol e milho.

A chuva esperada no final de maio garantirá as crescentes necessidades de humidade dos cereais de inverno no solo. Durante este período, o trigo estará na fase de maturação leitosa. Para as culturas de girassol semeadas dentro do prazo agrotécnico, será observada a formação da inflorescência. Em maio, permanece a possibilidade de granizo e o risco de danos às culturas agrícolas. Para culturas perenes e hortaliças afetadas por granizo, o tratamento com fungicidas à base de cobre é recomendado para limitar o risco de infeções secundárias por patógenos.

Condições mais adequadas para a realização de pulverizações fitossanitárias contra diversas doenças – podridão parda precoce, crivado, sarna em pomáceas, míldios em hortaliças e videiras, fusariose da espiga no

trigo – estarão disponíveis no final do primeiro decêndio, no início e no final do segundo, e durante a maioria dos dias do terceiro decêndio de maio.

Fonte NIMH