

Atividades agrotécnicas no pomar em maio

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 06.05.2024 *Брой:* 5/2024



Durante a maioria dos dias dos primeiros dez dias de maio, as condições agrometeorológicas serão determinadas por um tempo instável com chuvas frequentes, o que criará condições para o aumento do fundo infeccioso de doenças fúngicas. Os processos vegetativos nas culturas agrícolas prosseguirão a taxas moderadas em temperaturas próximas às normas climáticas.

Após o tempo instável até meados do mês, uma mudança nas condições agrometeorológicas é esperada na segunda quinzena de maio. Prevê-se um aumento das temperaturas médias diárias. A precipitação é esperada no final de maio. Ao longo do mês, permanece a possibilidade de granizo e o risco de danos às culturas agrícolas.

Em viveiros de frutas

Nos viveiros, é monitorizado o desenvolvimento adequado dos gomos enxertados. Se necessário, são realizadas novas desladragens de rebentos que brotaram do porta-enxerto.

Se houver risco de estrangulamento, as amarrações nos porta-enxertos reenxertados na primavera são afrouxadas.

Os viveiros de sementes, plantas-mãe e viveiros são cultivados. Se necessário, as plantas nos canteiros são desbastadas.

Em pomares de frutas

No final da floração, as colmeias são movidas para outro local – a pelo menos 5 km de distância.



Em pomares de pessegueiros recém-plantados com copa em taça ou taça melhorada, é realizada a poda de formação. Cuida-se da enraização e desenvolvimento adequados das árvores em pomares recém-plantados – sachas, desladragens, rega se necessário. As árvores em plantações jovens e densas são amarradas a uma estrutura de arame. Ramos fortes de dois e três anos são dobrados e amarrados aos arames para reduzir o seu vigor de crescimento. Em plantações jovens – de 2 e 3 anos – alguns dos frutos na haste principal - ramo

central são removidos. O trabalho de desbaste dos frutos dos pessegueiros continua. Após a queda final dos frutos, as plantações são irrigadas. A matéria orgânica de culturas de adubo verde é arada.

O solo é mantido livre de ervas daninhas e solto por meio de cultivo raso regular com um cultivador ou grade. No final do mês, as árvores frutíferas são fertilizadas com 15-20 kg/dka de nitrato de amónio ou a mesma quantidade de outro fertilizante nitrogenado.

A colheita das variedades precoces de cereja continua.

Em plantações de morango



A plantação primavera-verão de mudas de morango, armazenadas em frigorífico, continua. Após a plantação, é aplicada irrigação por névoa. As áreas plantadas em abril são capinadas. Em regiões mais altas, a palha é colocada sob os talos das flores até o final do mês.

A colheita continua. Quando os frutos são transportados por distâncias maiores, podem ser colhidos um pouco antes. Em caso de seca durante o amadurecimento dos frutos, é necessário aplicar irrigação por névoa ou irrigação por gravidade.

Em plantações de framboesa

É realizado o cultivo regular do solo. Os rebentos de algumas variedades são amarrados à estrutura de suporte, enquanto para outras variedades, toma-se cuidado para evitar que caiam nas entre-linhas.



Durante a floração, é aconselhável fornecer duas colónias de abelhas por 10 dka.

Em plantações de groselha preta



Os cuidados continuam – cultivo e irrigação para as áreas de enraizamento. Os rebentos radiculares fracos e supérfluos são removidos. Em caso de seca, é realizada uma rega abundante. Começa o trabalho de organização da colheita dos frutos de groselha preta.

Em plantações com outras culturas

Porta-enxertos de limão são enxertados por borbulhia. A enxertia de dióspiro continua. A superfície do solo é mantida livre de ervas daninhas e regularmente solta por meio de cultivo raso. A rega frequente e regular é assegurada até o segundo período de dez dias.



A plantação de *Actinidia chinensis* em campo aberto continua. Após a plantação, é regada. As videiras de Actinidia são regularmente amarradas a ramos de suporte auxiliares. O caule não deve enrolar-se no ramo de suporte, e os rebentos laterais são removidos. São fornecidas três colónias de abelhas por 10 dka de Actinidia.