


Durante a terceira década de maio, para cereais de inverno bem supridos de umidade, ocorrerá a formação e enchimento do grão.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 23.05.2024 Брой: 5/2024



Após o tempo frio para a época em meados de maio, durante o terceiro decêndio do mês, prevê-se um aumento significativo das temperaturas, a normalização das condições térmicas e a ativação dos processos de vegetação nas culturas agrícolas.

A chuva esperada no final do segundo e início do terceiro decêndio na maioria das regiões de campo manterá as reservas de humidade do solo dentro dos limites ótimos na camada de 50 e 100 cm - mais de 85% de FC. Durante o período, para as culturas de cereais de inverno bem fornecidas de humidade, ocorrerá a formação e

o enchimento dos grãos. Nas regiões do sudeste (agroestação de Karnobat), para a cevada, mais cedo que o habitual, também será observada a fase de maturação leitosa.

A formação das folhas ocorrerá no milho e no girassol. No final do período, para o girassol semeado dentro do período agrotécnico, também será observado o início da formação da inflorescência.

O tempo instável previsto com chuvas frequentes durante o próximo período manterá um fundo infeccioso aumentado de patógenos fúngicos: podridão parda tardia em frutos em amadurecimento de variedades precoces de cereja, mofo cinzento em morangos, míldio em videiras e culturas vegetais, sarna em espécies de frutos de pomo, etc.



Mosca da cereja

Durante o terceiro decêndio de maio, a mosca-da-cereja causa danos às variedades de cereja de meia estação precoce. Para limitar os danos causados por esta praga, recomenda-se o tratamento no início da fase de amadurecimento dos frutos (quando os frutos da cereja começam a ficar ligeiramente rosados) com um inseticida com um curto período de carência.

Nos vinhedos, devem continuar os levantamentos para a presença e atividade nociva das larvas da primeira geração da traça-da-uva, e em culturas de frutas – para a traça-da-maçã, a traça-da-ameixa e a traça-oriental-

da-fruta.

Durante o período, o aumento do teor de humidade nas camadas superiores do solo limitará o cultivo sazonal do solo e o combate à vegetação daninha competitiva.

Fonte NIMH