


'Junho – de tempo instável com precipitação a condições de calor acima do normal'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.06.2024 Брой: 6/2024



Em junho, as condições agrometeorológicas serão determinadas por tempo instável com precipitação, em torno e acima da norma mensal, o que manterá boas e muito boas reservas de umidade na camada de solo de 50cm e 100cm – mais de 75-80% da CC (Capacidade de Campo). Níveis mais baixos de reservas de umidade do solo são previstos em alguns locais nas regiões nordeste e sudoeste extremas (Razgrad, Ruse, Silistra, Sandanski), onde a chuva de maio ficou abaixo da norma mensal.

No início de junho, o desenvolvimento das culturas agrícolas prosseguirá a um ritmo acelerado, sob condições térmicas acima do normal. Devido às altas temperaturas durante a vegetação primaveril do trigo e da cevada, eles completarão seu desenvolvimento mais cedo do que o habitual. Durante os primeiros dez dias de junho,

será observada a maturação cerosa em massa para a cevada nas áreas de campo, e no final do período de dez dias - a maturação completa. Para o trigo durante este período, ocorrerá a maturação leitosa, transição para cerosa e cerosa.

Durante a maioria dos dias do segundo período de dez dias, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas próximas às habituais para o período. No meio do período de dez dias, as culturas de cereais de inverno em campos altos entrarão na fase de maturação. Para o milho, ocorrerá a formação de folhas, e para os girassóis, prevalecerá a formação de inflorescências.

Na maior parte do período de 7 a 13 de junho, as condições agrometeorológicas serão determinadas por tempo quente com probabilidade de precipitação local e granizo. As temperaturas máximas excederão 30°C durante todo o período, atingindo 38°C na Planície da Trácia, o que é um pré-requisito para o estresse térmico e a deterioração das condições para o desenvolvimento normal das plantas cultivadas em seus estágios vegetativos e generativos.

No início do segundo período de dez dias de junho, ocorrerá a formação de folhas para o milho; para os girassóis semeados dentro do prazo agrícola ideal - a formação de inflorescências; para as culturas leguminosas (feijão, soja) - a brotação e a floração. Para a cevada nas áreas de campo, prevalecerá a maturação cerosa. Para o trigo, ocorrerá a maturação leitosa e cerosa em massa. Para a colza, será observada a fase de maturação.

As condições térmicas acima do normal previstas durante o terceiro período de dez dias de junho acelerarão a vegetação das culturas de primavera, e algumas delas entrarão nas fases reprodutivas de seu desenvolvimento. Para as culturas de girassol semeadas dentro do prazo agrícola ideal, será observado o início da fase de floração, e para híbridos de milho mais precoces - o pendoamento e a liberação de anteras. Durante este período, são previstas temperaturas máximas de até 35-36°C, o que afetará negativamente a floração e a fertilização em culturas hortícolas.

Em junho, a chuva frequente prevista é um pré-requisito para o desenvolvimento de doenças fúngicas: podridão parda tardia, sarna e oídio em árvores frutíferas; requeimas em culturas hortícolas; míldio, oídio e podridão cinzenta em videiras. Condições mais adequadas para a realização de pulverizações fitossanitárias serão criadas durante a segunda quinzena do mês.

! Temperaturas elevadas e baixa umidade atmosférica limitarão as possibilidades de realização de medidas fitossanitárias e dificultarão os trabalhos de campo.

Fonte NIMH