

Julho – tempo seco e quente, o que levará a um encurtamento dos períodos interfásicos nas culturas agrícolas

Автор(и): Растителна защита

Дата: 03.07.2024 *Брой:* 7/2024



Durante a primeira metade da primeira década do mês, as condições agrometeorológicas serão determinadas por tempo instável. A precipitação prevista em muitos locais das áreas de campo do país melhorará temporariamente as condições para o curso dos processos de vegetação nas culturas de primavera.

Durante a maioria dos dias da segunda e terceira décadas de julho, espera-se um tempo relativamente seco e quente, o que levará a um encurtamento dos períodos interfásicos. Um fator limitante para o desenvolvimento

do milho e do girassol será o déficit de humidade do solo. No milho, serão observados vários estágios – emborrachamento, floração da espiga e emissão dos estigmas. No final do mês, será observado o início da maturação leitosa em híbridos precoces de milho. No girassol, ocorrerão a floração, a fertilização e o enchimento das sementes. Os valores máximos de temperatura esperados entre 35-40°C terão um impacto negativo nas culturas durante a fase reprodutiva.



As altas temperaturas previstas para julho e o tempo relativamente seco limitarão o desenvolvimento de doenças fúngicas nas culturas agrícolas, com exceção dos *oídios* em culturas perenes e hortícolas. A precipitação esperada, em torno e abaixo da norma mensal, exigirá a aplicação de um regime de irrigação intensificado.



Condições mais adequadas para a realização de pulverizações de proteção de plantas (contra a segunda geração de vermes da fruta em pomares, contra o ácaro amarelo da videira em vinhas) ocorrerão durante a segunda metade da primeira década, na maioria dos dias da segunda década e no final do mês. Os tratamentos devem ser realizados durante as horas mais frescas do dia.

Nas regiões ocidentais do país, a probabilidade de fenómenos locais intensos e de granizo e da ocorrência de danos às culturas agrícolas permanece elevada – acamamento das searas e debulha do grão, lesões mecânicas nas culturas de primavera e na produção hortofrutícola. A colheita do trigo numa grande parte das áreas de campo do país ocorrerá em condições de risco elevado de incêndios.

Fonte: NIMH