

Setembro – as condições permitirão a formação de rendimento adicional das culturas de hortaliças tardias

Автор(и): Растителна защита

Дата: 07.09.2024 *Брой:* 9/2024



Durante a maioria dos dias da primeira década de setembro, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas acima das normas climáticas, o que acelerará a conclusão das fases finais de desenvolvimento das culturas tardias. Nos híbridos de milho tardio, serão observados os estágios de maturação cerosa e maturação plena. Na primeira metade do período, nas regiões orientais, prevê-se uma maior probabilidade de precipitação, bem como uma melhoria da humidade do solo nas camadas superiores e das condições para a realização da lavoura pré-semeadura. Na restante parte das áreas agrícolas do país, as condições permitirão a libertação de terrenos das colheitas maduras de girassol e milho.

Durante a segunda década do mês, espera-se uma mudança nas condições agrometeorológicas. Para a maioria dos dias do período, prevê-se uma diminuição relativa das temperaturas, juntamente com condições para precipitação em mais locais nas regiões agrícolas. A precipitação esperada, após a seca intensificada no final do verão, melhorará o estado das camadas superiores do solo e as condições para uma lavoura pré-semeadura e sementeira de colza de inverno de maior qualidade. O período agrotécnico ideal para a sementeira da colza é até ao final da segunda década de setembro.

A precipitação prevista durante a segunda e a primeira metade da terceira década aumentará o risco de desenvolvimento de agentes patogénicos fúngicos na produção de frutas e legumes em maturação: podridão cinzenta nas uvas, podridão parda tardia nos frutos das variedades tardias de árvores de fruto, míldios nas culturas hortícolas.



Bicho-do-fruto (Helicoverpa armigera)

Em setembro, para as culturas hortícolas de produção tardia, não deve ser subestimada a pulverização de proteção de plantas contra as lagartas da terceira geração do bicho-do-fruto, pois causam danos e deterioram a qualidade da produção hortícola.

Durante a segunda metade da terceira década, espera-se tempo seco e condições favoráveis para a colheita da produção madura de uvas.

Em setembro, não são previstas temperaturas mínimas críticas, e as condições permitirão a formação de produção adicional das culturas hortícolas tardias.

Fonte: NIMH