

De que e como proteger as árvores frutíferas em setembro

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 08.09.2024 *Брой:* 9/2024



No final do período vegetativo, o desenvolvimento de doenças desacelera, mas não cessa completamente.

A precipitação prevista durante a segunda e a primeira metade da terceira década aumentará o risco de desenvolvimento de patógenos fúngicos na cultura de frutos em maturação – podridão parda tardia, sarna tardia nos frutos de variedades tardias de árvores frutíferas.

A densidade populacional de pragas diminui significativamente. Muitas delas entraram em estágios inativos – pupas, ovos. No entanto, larvas de eclosão tardia da segunda geração de traças-das-frutas continuam a causar

bichado nos frutos. Outras pragas também são prejudiciais. Portanto, as atividades de proteção das plantas continuam durante o mês.

Em pomares

As instalações de armazenamento de frutas são desinfetadas. Isto é realizado por um especialista!



Lagarta do pinheiro – *Lymantria dispar*

Para determinar a população hibernante da lagarta do pinheiro, as posturas de ovos nos troncos e ramos grossos de 40–60 árvores são contadas, e para a lagarta-dos-frutos – os anéis de ovos em raminhos de dois, três e quatro anos.

Os frutos do pêssego são inspecionados nos pontos de manipulação para detectar a traça-oriental-do-pessegueiro em áreas onde ela ainda não ocorreu.

Cerca de duas semanas antes da colheita, os pomares de macieira e pereira cujos frutos se destinam ao armazenamento são tratados com Captan 80 WG (150–180 g/da) para protegê-los da sarna tardia e de outras doenças que se desenvolvem em armazéns de frutas.

Para determinar a densidade populacional do gorgulho-das-gemas-da-pereira no final do mês, 10 árvores por 500 decares, espalhadas pelo pomar, são sacudidas – inicialmente em dias alternados, e após a descoberta dos primeiros insetos, diariamente.

Os castanheiros são pulverizados no início do mês, antes da postura dos ovos, com Coragen 20 SC (18–30 ml/da) ou outro inseticida de contato para o controle do gorgulho-da-castanha. A pulverização é repetida mais duas vezes em intervalos de 7–10 dias.

Em plantações de morango

Antes do transplante, para canteiros livres de ervas daninhas, as plantações de morango são tratadas com Roundup Energy (300–500 ml/da para ervas daninhas anuais e bienais e 500–800 ml/da para ervas daninhas perenes).



Gorgulho-da-raiz-do-morango

As plantações de morango são irrigadas com um dos inseticidas – Decis 100 EC (17,5 ml/da) ou outro produto à base de deltametrina, Mospilan 20 SP (30 g/da), Naturalis (300 ml/da) até que o solo esteja umedecido a uma profundidade de 15 cm contra as larvas dos gorgulhos-da-raiz.

O material de plantio de morango é inspecionado quanto a doenças e pragas que são transmitidas com ele – manchas foliares brancas e marrom-púrpura, gorgulhos-da-raiz, nematodo-do-morango, ácaro-do-morango, doenças virais, etc.

Os estolões de morango são desinfetados se estiverem infestados pelo ácaro-do-morango ou nematodo-do-morango, mergulhando-os por 13–15 minutos em água a uma temperatura de 45–50 °C.