

Outubro – precipitação de importância agronômica e boas condições para o desenvolvimento da colza de inverno

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.10.2024 *Брой:* 10/2024



Em outubro, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas próximas e acima das normas climáticas e precipitação próxima das médias mensais. Após a seca estival, as chuvas economicamente significativas de setembro, em certas áreas do Leste e em locais do Oeste da Bulgária, melhoraram o teor de humidade das camadas superficiais do solo e as condições para a realização da preparação sazonal do solo.

A precipitação no final de setembro distribuiu-se de forma desigual. Em muitos locais do Centro e Nordeste da Bulgária, registaram-se precipitações de até e acima de 30-35 l/m² (Veliko Tarnovo - 40 l/m², Ruse - 43 l/m², Razgrad - 36 l/m², Silistra - 45 l/m², Varna - 45 l/m², Dobrich - 53 l/m²), o que levou a uma melhoria substancial das reservas de humidade nas camadas superficiais do solo e nas condições para a realização da preparação sazonal do solo. Ao contrário das regiões centrais e orientais, em partes do Oeste e Sul da Bulgária as chuvas no início do outono não tiveram significado económico. Nestas partes do país, o solo seco e compactado dificulta seriamente a aração profunda e a preparação pré-sementeira das áreas destinadas à sementeira com culturas de inverno.

Durante a maioria dos dias da primeira década de outubro, não está prevista precipitação significativa e as condições permitirão a preparação dos campos e a sua sementeira com culturas cerealíferas de inverno. A seca estival impediu a sementeira atempada da colza de inverno e, em locais das regiões aráveis do Centro da Bulgária, as áreas serão semeadas fora do prazo agrotécnico. É altamente provável que as searas semeadas tardiamente não atinjam a fase de roseta durante a sua vegetação outonal, o que garante a hibernação bem-sucedida da cultura sem danos.

Em outubro, decorrem os períodos agrotécnicos ótimos para a sementeira das culturas cerealíferas de inverno. O prazo para o Norte da Bulgária é durante a primeira metade do mês, para o Sul da Bulgária durante a segunda metade do mês, e para as regiões do Mar Negro durante a terceira década. As chuvas esperadas no final da primeira e início da segunda década, bem como durante a segunda metade da terceira década do mês, terão importância significativa para o progresso normal das fases iniciais da vegetação do trigo e da cevada. Em outubro, dependendo das datas de sementeira, serão observadas no trigo as seguintes fases – emergência, primeira e terceira folhas.



O tempo quente previsto para a segunda metade do mês será um pré-requisito para o aumento da população do rato-do-campo. Os campos com culturas de outono devem ser monitorizados, e quando for atingido o limiar económico de dano – LED: 2 colónias ativas/ha – devem ser tratados.

Existirão condições para trabalhos de campo em meados da segunda e durante a primeira metade da terceira década, quando está previsto tempo relativamente seco.



Em outubro, em pomares de macieira e pereira afetados pela sarna, para reduzir a infecção, é aconselhável no início da queda das folhas, após a colheita dos frutos, realizar um tratamento com uma solução de ureia a 5%.

Para as espécies de fruteiras de caroço, após a queda massiva das folhas, recomenda-se a pulverização com calda bordalesa a 2% contra os agentes causadores da cribose, da podridão castanha precoce e da lepra do pessegueiro.

No início de outubro, estão previstas geadas no solo, o que limitará as possibilidades de produção adicional de culturas hortícolas tardias suscetíveis a danos por geada.

Fonte: NIMH