

Atividades agrotécnicas no pomar em outubro

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 08.10.2024 *Брой:* 10/2024



Em outubro, em todas as espécies de árvores frutíferas, o processo de acumulação de nutrientes de reserva ocorre ativamente.

Durante o mês, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas em torno e acima das normas climáticas e por precipitação próxima das normas mensais.

Durante a maioria dos dias da primeira década de outubro, não há previsão de precipitação significativa. Espera-se chuva no final da primeira e no início da segunda década, bem como durante a segunda metade da terceira década do mês.

Condições para trabalhos de campo ocorrerão no meio da segunda e durante a primeira metade da terceira década, quando está previsto tempo relativamente seco.

Em viveiros frutícolas



Cuidado é tomado para preservar a capacidade germinativa das sementes de espécies de frutas de caroço coletadas para estratificação.

Inicia-se a preparação para a retirada dos porta-enxertos dos canteiros de sementes e das mudas de viveiro de dois anos.

Os porta-enxertos dos canteiros de sementes e as árvores enxertadas são retirados após o término do seu período de vegetação – na segunda metade de outubro e em novembro.

As plantas não devem ter folhas. Se as folhas não caíram, utiliza-se 0,1-0,2% de cloreto de cálcio para esse fim. A irrigação facilita a retirada.

Em pomares



Continua a colheita de amêndoa e de alguns frutos de ameixeira.

A colheita das cultivares de maçã e pera de outono-inverno deve ser concluída o mais tardar em meados do mês.

O solo nas entrelinhas de pomares com um ano e jovens é profundamente cultivado.

Se não foi realizada adubação pré-plantio com fertilizantes de fósforo e potássio, aplicam-se 50-60 kg de superfosfato e 20-22 kg de sulfato de potássio – ou outro fertilizante de fósforo e potássio na mesma quantidade por decaire –.

Fertilizantes de fósforo e potássio também são incorporados profundamente em pomares em produção.



Em plantações de morango

Continua o estabelecimento de novas plantações de morango.

O plantio dos estolões deve ser concluído o mais tardar em meados do mês. Os estolões devem ser destacados, com uma pequena quantidade de terra ao redor das raízes. Após o plantio, é realizada irrigação com $0,5-1 \text{ dm}^3$ de água por planta.

Realiza-se a cultura final das plantações em produção – a uma profundidade de 10-15 cm, com as plantas sendo levemente amontoadas.

Continua a retirada e preparação para armazenamento refrigerado de estolões destinados ao plantio primavera-verão.

Em plantações de framboesa

Áreas para estabelecer novas plantações de framboesa estão sendo preparadas.

Plantações em produção são fertilizadas com 2-3 t de estrume, 20-30 kg de superfosfato e 10-15 kg de sulfato de potássio – ou outro fertilizante de fósforo e potássio na mesma quantidade por decare, após o que os fertilizantes são profundamente arados – a 20-25 cm de profundidade.

Em plantações de groselha-preta

Em condições secas, plantações em produção e jovens são irrigadas.

A adubação de outono é realizada com 1-2 t de estrume, 20-40 kg de superfosfato e 10-15 kg de sulfato de potássio – ou outro fertilizante de fósforo e potássio na mesma quantidade por decaire. O solo nas entrelinhas é cultivado a uma profundidade de 15-18 cm, e próximo às plantas – a 5-6 cm.

Em plantações com outras culturas

Realiza-se a aração de outono a uma profundidade de 18-20 cm, o que contribui para um bom armazenamento de umidade do solo a partir da precipitação de inverno.

Após o terceiro ano, a parte aérea das plantações de louro é cortada a 20-25 cm do colo da raiz. Os caules cortados são levados para uma sala seca e bem ventilada para secagem das folhas.



Inicia-se a colheita de caqui, romã e kiwi (Actinidia).

No final do mês, em caso de risco de geada e tempo relativamente seco, todas as plantas de louro (folha de louro, loureiro) são amontoadas com um arado.

Continua a colheita dos frutos da figueira.

Continua o cuidado com estacas verdes de Actinidia, aronia, espinheiro-marítimo e outras, colocadas para enraizamento.

Inicia-se a coleta de sementes de terebinto para a produção de porta-enxertos de pistache.