

Atividades de proteção das plantas no pomar em outubro

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 08.10.2024 *Брой:* 10/2024



No início de outubro, estão previstas geadas.

Em outubro, em pomares de macieira e pereira afetados pela sarna, para reduzir o inóculo, é aconselhável, no início da queda das folhas e após a colheita dos frutos, realizar um tratamento com uma solução de ureia a 5%.

Para as espécies de frutas de caroço, após a queda massiva das folhas, recomenda-se a pulverização com calda bordalesa a 2% contra os agentes causadores da cribose, da podridão parda precoce e da enroladura das folhas do pessegueiro.

Nos pomares

Caixas-ninho e comedouros são colocados nas árvores frutíferas para atrair aves benéficas.

Armadilhas de bandas de cartão ondulado com as lagartas presentes da traça-das-maçãs, da traça-das-ameixas e da traça-da-nogueira são recolhidas e colocadas em gaiolas suspensas nos pomares – os pica-paus e outras aves destroem as lagartas nas bandas.



No tronco de cada árvore em pomares infestados por lagartas-geómetras, coloca-se uma banda adesiva a uma altura de 20–100 cm. As bandas são feitas de papel com 20 cm de largura, com as bordas superior e inferior amarradas. Utiliza-se uma cola de secagem lenta para o revestimento. Para evitar que os insetos se escondam antes de chegar à banda, a casca gretada desde a banda até à superfície do solo é removida previamente.

Os frutos de maçã e pera são inspecionados nos pontos de classificação e manipulação quanto à presença da cochonilha-de-San-José e da cochonilha-branca-da-amoreira em áreas não infestadas.



Contam-se os ninhos de lagartas da lagarta-do-figueiro para determinar a densidade populacional da praga.



A sacudidura das árvores, iniciada no final de setembro, continua para determinar a densidade populacional do gorgulho-dos-gomos-da-pereira. Quando a densidade excede o limiar económico, antes da postura, as árvores

são pulverizadas com um inseticida de contacto de qualquer grupo – Decis 100 EC (12,25 ml/da) ou outro produto à base de deltametrina, Sumi Alpha 5 EC (0,03%), Karate Zeon 5 SC (15 ml/da), Lamdex extra (100–120 g/da) e outros.

Os pomares de pereira são pulverizados contra a psila-da-pereira com um dos inseticidas – Bermectin (40–120 ml/da) ou outro produto à base de abamectina, Voliam Targo 063 SC (75 ml/da), Imidan 50 WG (150 g/da), Delegate 250 WG (30 g/da), Dekka EC (50 ml/da) ou outro produto à base de deltametrina, Movento 100 SC (0,12–0,15%), Naturalis (100–200 ml/da), Sineis 480 SC (30–44 ml/da), Flipper (1–2 l/da).



Ramos com pulgões-lanígeros parasitados pela vespa parasitóide *Aphelinus mali* são cortados e armazenados num local fresco e à sombra, sob abrigo. Os pulgões-lanígeros que contêm esta vespa são de cor preta e não têm orifício de saída. Na primavera do ano seguinte, são utilizados para controlo biológico.