

Novembro – as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas e precipitação próximas das normas climáticas

Автор(и): Растителна защита

Дата: 04.11.2024 Брой: 11/2024



Em novembro, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas e precipitações próximas das normas climáticas.

A seca acentuada em outubro impediu a semeadura das culturas de cereais de inverno e parte das áreas planejadas será semeada em novembro, após os prazos agrotécnicos. Como resultado da precipitação abaixo do normal em outubro, as reservas de umidade do solo nas camadas de 50 e 100 cm na maior parte do país, com exceção de algumas localidades nas regiões nordeste (Dobrich), estão anormalmente baixas para meados

do outono – em alguns lugares abaixo de 50% da capacidade de campo (estações agrometeorológicas: Knezha, Bazovets, Kyustendil, Sandanski, Plovdiv, Pazardzhik, Chirpan).

Durante a primeira metade da primeira década de novembro, não é esperada precipitação e o fator limitante para o desenvolvimento do trigo, cevada e colza de inverno na maioria das regiões agrícolas continua sendo o déficit de umidade do solo.

Após as temperaturas acima da estação no final de outubro e início de novembro, prevê-se um resfriamento e uma mudança nas condições agrometeorológicas. Durante a maioria dos dias no início de novembro, as temperaturas estarão abaixo das normas climáticas, mas acima do mínimo biológico necessário para a vegetação das culturas de cereais de inverno. Durante o período, não é esperada precipitação de importância econômica e o fator limitante para o desenvolvimento das culturas de outono semeadas continua sendo o déficit de umidade do solo. No início de novembro, nas culturas de cereais de inverno semeadas até meados de outubro, serão observadas as fases de emergência e formação de 1–2 folhas.

O risco das moscas-dos-cereais nunca diminui

Nos estágios iniciais da vegetação do trigo e da cevada, as lavouras devem ser monitoradas quanto a pragas. Danos são causados pelo rato-do-campo, pelas larvas do besouro-da-folha do trigo e pelas moscas-dos-cereais, e quando sua densidade excede o limite econômico de dano, são necessárias medidas oportunas de proteção de plantas.



Larvas da mosca-sueca

Precipitação e uma melhoria gradual das reservas de umidade nas camadas superficiais do solo são esperadas durante a segunda metade da primeira e durante a segunda década de novembro.



A praga mais perigosa das culturas de cereais é o besouro-da-folha do trigo (Zabrus tenebrioides), que ataca trigo, cevada, milho, aveia e uma série de espécies de gramíneas.

Durante a terceira década, os valores previstos das temperaturas médias diárias, em torno e acima do normal para o período, excederão o mínimo biológico necessário para a vegetação das culturas de outono.

No final de novembro, o trigo e a cevada estarão em diferentes estágios de crescimento – desde a emergência até 1, 2 e 3 folhas. O estágio de terceira folha predominará nos cereais de inverno semeados em outubro. Na colza, apenas parte das lavouras conseguirá entrar no estágio de formação da roseta (5–7 folhas) durante novembro.

Durante o mês, as temperaturas mínimas previstas, até -7°C, estão acima dos níveis críticos para as culturas de cereais de inverno no estágio de emergência.

Em novembro, as condições para a realização de pulverizações de proteção de plantas de outono em pomares serão adequadas no início do mês, no meio da segunda e durante a maioria dos dias da terceira década. Para espécies de frutas de pomóideas (maçã, pêra), para limitar infecções de sarna, é recomendado o tratamento com uma solução de ureia a 5%. Para espécies de frutas de caroço, após a queda massiva das folhas, é necessária a pulverização com uma calda bordalesa a 2% contra os agentes causadores da doença das manchas das folhas, da podridão parda precoce, do enrolamento das folhas do pessegueiro e outros patógenos.

A segunda metade de novembro é um período adequado para o plantio de árvores frutíferas.