

As chuvas desigualmente distribuídas no país levam a diferenças no estado fenológico das culturas de cereais de inverno.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 20.11.2024 *Брой:* 11/2024



Até o final da segunda e o início da terceira década de novembro, elas serão determinadas por temperaturas médias diárias acima das normas climáticas e acima do mínimo biológico necessário para a vegetação das culturas de cereais de inverno.

Durante o período, não são esperadas precipitações significativas e mudanças nos níveis das reservas de umidade do solo no outono. A precipitação que caiu no período passado foi distribuída de forma desigual. Em muitos lugares das regiões noroeste, na Planície da Trácia Superior e nas partes extremas do sul do país,

foram registradas precipitações abaixo de 10-12 l/m² – completamente insuficientes para superar o déficit de umidade nas culturas de cereais de inverno.

Em algumas das regiões orientais (Razgrad, Ruse, Silistra, Sliven, Karnobat) ocorreu precipitação significativa – acima de 25-30 l/m². Nessas regiões, ocorreu uma melhoria nas reservas de umidade do solo nas camadas superiores do solo e nas condições para a vegetação das culturas de outono-inverno.

Enquanto no país outubro e o início de novembro foram períodos de seca e falta de precipitação agricolamente eficaz, na região de Dobrich são observadas reservas de umidade do solo suficientes, que contribuem para o bom desenvolvimento dos estandes de trigo. As temperaturas permitem uma emergência normal onde a umidade é suficiente. As temperaturas mais baixas na Dobruja protegem os estandes de outono-inverno de ataques de pragas, como moscas-dos-cereais e pulgões.

Durante o período, serão observados diferentes estágios no trigo – germinação, emergência (estações agrometeorológicas: Knezha, Nikolaevo, Kazanlak, Plovdiv, Haskovo, Yambol) e formação da 1^a–2^a e 3^a folha (Novachene). As diferenças na condição fenológica das culturas de cereais de inverno são consequência da prolongada seca outonal e da semeadura tardia.

Durante o período, as condições serão adequadas para o plantio de árvores frutíferas e para a realização de atividades fitossanitárias em culturas frutíferas.

Fonte: NIMH