

No início de dezembro, a precipitação prevista aumentará as reservas de umidade nas camadas superiores do solo.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.12.2024 Брой: 12/2024



Durante o próximo período de sete dias, as condições agrometeorológicas sofrerão uma mudança substancial. Na Bulgária Ocidental, prevê-se uma diminuição significativa das temperaturas, mas sem valores mínimos críticos para as culturas outonais que estão atrasadas em seu desenvolvimento. A onda de frio no início de dezembro levará a uma desaceleração e, nos campos mais altos, onde se espera a formação de uma cobertura de neve, a uma cessação dos processos de vegetação nas culturas de cereais de inverno.

Na maioria das regiões orientais e meridionais, as temperaturas médias diárias previstas estarão próximas do mínimo biológico necessário para o desenvolvimento das culturas de cereais de inverno. Condições para a vegetação nas culturas outonais se desenvolverão nas regiões ao longo da costa do Mar Negro, onde são previstas temperaturas mais altas.

A precipitação esperada durante o período aumentará as reservas de umidade do solo nas camadas superficiais do solo. Esta precipitação será tardia para parte das culturas em alguns locais das regiões central e sul, onde, devido a um déficit de umidade do solo, as culturas de cereais de inverno germinadas não conseguiram emergir. Como resultado da prolongada seca outonal, uma grande parte das culturas de cereais de inverno está mal estabelecida, em estágio inicial de desenvolvimento, e as lavouras têm densidade irregular. No início de dezembro, os seguintes estágios serão observados no trigo: emergência, 1–2 e 3 folhas. Uma pequena parte das lavouras nas regiões nordestinas, onde a umidade durante a primeira metade do outono não foi um fator limitante, está na fase de perfilhamento (região de Provadia) – o estágio apropriado para a hibernação.

Durante o período, condições mais adequadas para o plantio de árvores frutíferas ocorrerão nas regiões orientais do país.

Fonte NIMH