

Dezembro – temperaturas próximas das normas climáticas e precipitação de significado agrícola

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.12.2024 Брой: 12/2024



No início de dezembro, prevê-se uma diminuição substancial das temperaturas, o que levará a uma desaceleração e cessação da vegetação nas culturas de outono na maioria das regiões aráveis do país.

No leste da Bulgária, onde os valores máximos atingirão 15-16°C, serão criadas condições para uma ativação de curto prazo da vegetação nas culturas de outono, mas não se espera uma mudança significativa no estado fenológico das culturas de cereais de inverno.

No início do mês, como resultado da prolongada seca outonal, grande parte das culturas de trigo cessará sua vegetação subdesenvolvida, numa fase inicial de crescimento. Nas culturas de cereais de inverno predominam

as fases de emergência e formação inicial das folhas (1-2 folhas), o que levanta dúvidas quanto ao seu sucesso na hibernação. Uma pequena parte das culturas nas regiões nordestinas (Targovishte, Silistra, Provadia), onde a humidade durante a primeira metade do outono não foi um fator limitante, encontra-se na fase da terceira folha e no início do afilhamento (região de Provadia) – a fase apropriada para a hibernação.

Até ao final da primeira e durante a maioria dos dias da segunda e terceira décadas, as temperaturas previstas, próximas das normas climáticas, manterão as culturas agrícolas de inverno em dormência. Durante o mês, prevêem-se temperaturas mínimas até -10°C que, na ausência de cobertura de neve e com uma persistência mais prolongada, serão críticas para as culturas de cereais de inverno subdesenvolvidas nas fases de emergência e formação inicial das folhas.

A precipitação esperada em dezembro, em torno da norma mensal, aumentará as reservas de humidade do solo nas camadas de 50 e 100 cm.

A precipitação que caiu no início de dezembro excedeu 30-40l/m² em muitos locais do centro e sul da Bulgária (Lovech - 33l/m², Blagoevgrad - 41l/m², Sandanski - 42l/m², Plovdiv - 42l/m², Haskovo - 41l/m², Kardzhali - 50l/m², Chirpan - 39l/m²), o que levou à superação do défice de humidade para as culturas de outono nas camadas superiores do solo. Durante o período seguinte, espera-se mais precipitação agronomicamente significativa, bem como um aumento do nível das reservas de humidade do solo nas camadas de 50cm e 100cm.

Fonte: NIMH