

# Janeiro – um período dinâmico com intervalos alternados de temperaturas acima do normal, próximas do normal e abaixo do normal

*Автор(и):* Растителна защита

*Дата:* 05.01.2025 *Брой:* 1/2025



Em janeiro, as condições agrometeorológicas serão determinadas por um tempo dinâmico, com períodos alternados de temperaturas acima, próximas e abaixo da média.

Durante o mês mais frio do ano, o sucesso da hibernação das culturas de outono-semeadura dependerá do seu estágio fenológico, dos valores das temperaturas mínimas e, em grande medida, da presença de uma cobertura de neve persistente.

Na maioria dos dias do mês, as temperaturas médias diárias previstas estarão dentro de faixas que manterão as culturas de cereais de inverno em dormência profunda. Exceções são possíveis durante os períodos relativamente mais quentes ao longo da costa do Mar Negro e no vale do rio Struma, onde parte das culturas de outono-semeadura passará de dormência profunda para temporária, mas a probabilidade de retomada dos processos vegetativos nos cereais de inverno é baixa.

As culturas de trigo hibernarão em diferentes fases fenológicas. As predominantes estão na fase de terceira folha. Na fase de afilhamento, que é a fase apropriada para a hibernação, estão as culturas em locais do Nordeste da Bulgária (Shumen, Targovishte, Silistra, Provadia). Nas regiões ocidentais (estações agrometeorológicas: Bazovets, Kneja, Lozen, Kyustendil, Sandanski), como resultado da prolongada seca de outono e da semeadura tardia, parte das culturas de cereais de inverno está em um estágio inicial de seu desenvolvimento – na fase de emergência. Essas culturas não estão bem endurecidas e serão as mais vulneráveis a baixas temperaturas negativas durante o mês.

Em janeiro, as temperaturas mínimas previstas, em alguns locais até -20°C a -15°C, em condições sem cobertura de neve e com persistência mais prolongada, serão críticas para as culturas não afilhadas.

---

### **A videira é mais suscetível à excoriose após o inchamento das gemas**

---

Valores abaixo de -16°C a -17°C são perigosos para as gemas das variedades de uva de mesa menos resistentes ao frio. Nos vinhedos, durante o período de dormência, é aconselhável realizar o monitoramento da presença da doença excoriose. Os sintomas da doença são observados nos ramos maduros – a casca na base do primeiro e segundo entrenó fica esbranquiçada e descama em tiras. Para limitar a doença, os ramos atacados pelo patógeno devem ser podados e destruídos em tempo hábil, e as ferramentas devem ser desinfetadas.

Durante o mês, a precipitação esperada, em torno e acima das normas climáticas, aumentará as reservas de umidade mesmo na camada de solo de dois metros. A precipitação de dezembro, que em muitas partes do país excedeu duas vezes a norma mensal, aumentou acentuadamente as reservas de umidade do solo. No início do inverno, na maioria das áreas de campo, o nível de reservas de umidade na camada de solo de 100 cm sob as culturas de outono está acima de 85-90% da capacidade de campo.

Em janeiro, condições mais adequadas para a realização da poda em pomares ocorrerão no início do mês, no final da segunda e durante a primeira metade da terceira década.