

No início de fevereiro, as culturas de outono estão em boas condições.

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.02.2025 Брой: 2/2025*



As temperaturas excepcionalmente altas durante a última semana de janeiro, atingindo 17-18°C em muitas partes do país, e em certas regiões do Norte da Bulgária – até e acima de 20°C (Vratsa - 22°C, Pleven - 22°C, Lovech - 22°C, Veliko Tarnovo - 23°C, Silistra - 20°C), levaram ao reinício dos processos vegetativos nas culturas de outono-semeadura em parte das áreas de campo do país. As temperaturas acima do normal para janeiro também interromperam a dormência em algumas espécies arbóreas.

As culturas de outono-semeadura na Dobrudja estão em boas condições gerais, relata o Prof. Dr. Ivan Kiryakov, Chefe do Departamento "Melhoramento de Culturas de Cereais e Leguminosas de Grão" no Instituto Agrícola da Dobrudja – General Toshevo. O trigo, dependendo da data de sementeira, está em diferentes fases do seu

desenvolvimento - algumas culturas estão a sair do afilhamento, outras estão no início da fase. O seu conselho é adiar a fertilização para a segunda metade de fevereiro.

As culturas no Sul da Bulgária também estão a desenvolver-se normalmente e estão na fase de afilhamento. Não foram observados danos por doenças, pragas ou morte pelo inverno do trigo, partilhou connosco o Professor Associado Dr. Evgeniy Dimitrov do Instituto de Recursos Genéticos Vegetais "K. Malkov" em Sadovo. Lá, a adubação azotada de cobertura do trigo geralmente começa no início de fevereiro.

Um fator limitante para o desenvolvimento das culturas em todo o país é a humidade na camada do solo, que nas condições das regiões sul do país nos últimos anos tem sido caracterizada por níveis muito baixos, bem abaixo do normal.

Após o tempo anormalmente quente, até ao final da semana as condições agrometeorológicas sofrerão uma mudança, que será substancial na segunda metade do período. O período de frio esperado irá parar a vegetação prematura das culturas cerealíferas de inverno e irá conter o desenvolvimento inicial indesejado das árvores de fruto.

Durante o período, não estão previstas temperaturas mínimas críticas para as culturas agrícolas em hibernação.

Condições mais adequadas para realizar o preparo do solo e a poda em vinhas e pomares ocorrerão no início do período.

foto© bluedesign - Fotolia.com

Fonte: NIMH e Agri.bg