

# Em março, as temperaturas estarão em torno e acima das normas climáticas, e a precipitação em torno e abaixo das normas.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 09.03.2025 Брой: 3/2025



Durante a primeira metade da primeira década do mês, as temperaturas previstas estarão dentro de intervalos que restringirão o desenvolvimento das culturas agrícolas.

Durante a segunda metade da década, espera-se um aumento substancial das temperaturas e os seus valores médios diários atingirão e excederão o mínimo biológico necessário para o reinício dos processos vegetativos nas culturas de cereais de inverno.

As temperaturas acima do normal previstas para a segunda década de março estimularão a vegetação das culturas de outono. Durante este período, algumas das culturas de trigo e cevada atualmente na fase de terceira folha entrarão na fase de afilhamento.

As temperaturas máximas esperadas, até e acima de 20°C, também ativarão os processos vegetativos numa grande parte das culturas perenes. Nas fruteiras, as fases de inchamento e rebentamento das gemas prosseguirão nas espécies de frutos de caroço de floração precoce (amendoeira, damasqueiro, pessegueiro). Nas vinhas das áreas de campo, será observado o fluxo de seiva.

As condições durante o período serão adequadas para a adubação de cobertura das culturas de inverno com fertilizantes minerais azotados, para a realização de preparação do solo pré-semeadura e sementeira das culturas de primavera precoce (ervilhaca, ervilha, cevada de primavera).

No início da segunda década de março, não é esperada precipitação, o que proporcionará uma oportunidade para a implementação atempada de pulverizações preventivas pré-floração em pomares com fungicidas à base de cobre contra os agentes causadores da murchidão das flores, da enrola das folhas do pessegueiro, da sarna e de outros patógenos.

Durante a terceira década, as temperaturas esperadas, próximas e acima das normas climáticas, manterão os processos vegetativos ativos nas culturas agrícolas. No final do mês, nas culturas de cereais de inverno que afilharam no outono, será observado um aumento no coeficiente de afilhamento.

Em março, nas fruteiras, prosseguirão as fases de inchamento e rebentamento das gemas. No final do mês, nas espécies de floração precoce – amendoeira, damasqueiro e pessegueiro – será observada a fase de gema floral, e em alguns locais das regiões sul – o início da floração. Nas vinhas das áreas de campo, será observado o fluxo de seiva.

*Durante o mês, as temperaturas mínimas previstas, até menos 7°C, representarão um risco para as fruteiras em fase de gema e floração.*

A precipitação em março aumentará as reservas de humidade do solo na camada de 100 cm. No final de fevereiro, na maior parte do país, com exceção de alguns locais nas regiões orientais, o nível de reservas de humidade do solo para as culturas de cereais de inverno na camada de um metro é baixo para a época – em partes da Planície Danubiana e das regiões sul, abaixo de 70% da capacidade de campo (CC). Normalmente,

no final do inverno, em anos sem anomalias climáticas, as reservas de humidade do solo na camada de um metro atingem níveis até à CC.

Em março, condições mais adequadas para a realização da preparação do solo pré-semeadura das áreas destinadas à sementeira com culturas de primavera precoces e médias-precoces ocorrerão durante a segunda metade do mês. Em meados de março, inicia-se o período agrotécnico (15-20.03) para a sementeira do girassol no Sul da Bulgária, e no meio da terceira década (25.03–5.04) – na Planície Danubiana.

*Fonte: NIMH*