

Abril – clima instável e precipitação de significância agrícola

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.04.2025 *Брой:* 4/2025



Em abril, as condições agrometeorológicas serão caracterizadas por uma dinâmica aumentada. Durante a maioria dos dias do mês, elas serão determinadas por tempo instável. A precipitação esperada, em torno e acima das normas climáticas, manterá boas reservas de umidade do solo na camada de 50 cm e as condições para a vegetação dos cereais de inverno e das culturas de primavera semeadas. Isto é afirmado na previsão mensal dos agrometeorologistas do NIMH.

Durante a primeira metade de abril, a vegetação das culturas agrícolas prosseguirá com temperaturas médias diárias em torno e abaixo das normas climáticas. Na primeira década, o trigo nas áreas de campo entrará na fase de alongamento do colmo.

Durante a segunda década, são previstas temperaturas mínimas negativas de até -2 a -3°C, com um risco aumentado de danos às flores e aos frutos jovens das árvores frutíferas. As últimas geadas da primavera são esperadas no final da década, o que deve ser levado em consideração ao endurecer as mudas de hortaliças.

Doenças de Septoria no trigo de inverno

Um aumento nas temperaturas médias diárias e uma aceleração das taxas de desenvolvimento das culturas agrícolas são previstos para o final da segunda e durante a terceira década. Durante este período, o trigo passará por uma transição do alongamento do colmo para o emborrachamento e a fase de espigamento. O período interfásico alongamento do colmo – emborrachamento é crítico para a infecção de cereais de inverno com a mancha foliar de Septoria.



Os estandes de trigo também devem ser monitorados quanto à presença de pragas – o crisomelídeo dos cereais, o percevejo-dos-cereais e, em densidades acima do limiar econômico de dano, o tratamento oportuno é necessário.



Sarna da macieira

A precipitação frequente durante o mês criará condições para um aumento do fundo de infecção de uma série de doenças fúngicas em culturas frutíferas – murcha das flores (podridão parda precoce), sarna, mancha bacteriana, enrolamento das folhas do pessegueiro, etc. Durante a primeira metade da terceira década, é prevista uma probabilidade aumentada de tempestades de granizo. As árvores frutíferas afetadas pelo granizo devem ser tratadas com fungicidas à base de cobre na primeira oportunidade, a fim de limitar o risco de infecções secundárias por patógenos.

Em abril, condições mais adequadas para a realização de pulverizações de proteção de plantas ocorrerão no início e no final da segunda década e durante a segunda metade da terceira década.

No início da terceira década, a temperatura do solo na camada de 10 cm atingirá valores adequados para a semeadura do milho, e no final de abril – também para as culturas de primavera termofílicas (algodão, feijão, amendoim, melancias, melões, etc.).