

Durante a segunda década de abril, prevê-se um aumento das temperaturas e uma melhoria nas condições para o desenvolvimento das culturas agrícolas.

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 11.04.2025 Брой: 4/2025*



O clima frio fora de época durante o período passado, com temperaturas mínimas abaixo de zero e queda de neve, causou danos irreparáveis às árvores frutíferas e às culturas de colza que haviam entrado na fase de floração, de acordo com agrometeorologistas. Os agrônomos estão prestes a realizar inspeções nas fazendas para determinar os danos às espécies frutíferas e a outras culturas agrícolas.

A primeira onda de frio no início do mês afetou seriamente os produtores de damasco na região de Silistra. Apesar dos danos causados pelas condições de inverno no país, a variedade „Silistrenska Kompotna“ preservou suas flores e espera-se que dê frutos.

O damasco „Silistrenska Kompotna“ é uma variedade padrão principal criada na estação experimental da cidade de Silistra em 1964, pelo cruzamento de um damasco húngaro com a variedade Krasnoshchekiy. A árvore tem vigor moderado com uma copa globular. A floração é média-tardia; é uma variedade autopolinizante.

Durante o próximo período de sete dias, as condições agrometeorológicas sofrerão uma mudança substancial. No início da segunda década de abril, prevê-se um aumento das temperaturas e uma melhoria nas condições para o desenvolvimento das culturas agrícolas.

Na maioria dos dias do período, a vegetação das culturas de cereais de inverno prosseguirá em um ritmo moderado, com temperaturas médias diárias próximas das normas climáticas para a segunda década de abril.

A precipitação generalizada durante a primeira década, que em algumas áreas de campo excedeu 40 - 50 l/m², e em locais no sul da Bulgária atingiu as normas para abril (Plovdiv - 57 l/m², Haskovo – 58 l/m², Kardzhali – 57 l/m², Chirpan – 56 l/m²), melhorou drasticamente as reservas de umidade do solo, o que é de grande importância para o curso normal dos processos de vegetação nas culturas de cereais de inverno e nas culturas de primavera semeadas.

No final do período, o estágio de alongamento do colmo será observado em grande parte dos estandes de trigo, durante o qual as plantas aumentam suas exigências de umidade do solo. Nas culturas de girassol semeadas no início da primavera, o estágio de emergência prevalecerá.

A precipitação esperada durante o período manterá um alto teor de umidade nas camadas superficiais do solo, o que atrasará a semeadura do girassol além dos prazos agrotécnicos recomendados.

Durante a segunda década de abril, as culturas de cereais de inverno devem ser monitoradas quanto à presença de doenças e pragas: oídio, mancha foliar de septoria, crisomelídeo dos cereais, tripes do trigo, percevejo-dos-cereais, etc., e se seus números excederem o limite econômico de dano, é necessário tratamento oportuno.