

Controle expresso de ervas daninhas para altas produtividades de girassol

Автор(и): ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ

Дата: 16.04.2025 Брой: 4/2025



Os herbicidas da FMC Agro Bulgária – Express® 50 SG e Evorelle® Express® – proporcionam proteção seletiva e campos limpos nos estágios iniciais de crescimento do girassol.

Os herbicidas Express® 50 SG e Evorelle® Express® destinam-se ao controle seletivo de plantas daninhas de folha larga em híbridos de girassol tolerantes ao Express® e ao Evorelle® Express®. É extremamente importante que os herbicidas sejam **aplicados apenas em híbridos tolerantes**, com a lista disponível no site da FMC. Para mais informações, consulte os representantes de vendas da FMC.

Express® 50 SG e Evorelle® Express® são os únicos herbicidas registrados para uso em um grande número de híbridos de girassol tolerantes ao Express® 50 SG / Evorelle® Express®.

Express® 50 SG – eficácia comprovada contra as principais plantas daninhas de folha larga no girassol

Express® 50 SG é um herbicida sistêmico de pós-emergência que proporciona controle confiável das plantas daninhas de folha larga mais difundidas e de difícil controle no girassol, como **cardo-rasteiro, corriola, caruru, estramônio, ançarinha-branca, quinoa-vermelha** e outras. O crescimento das plantas daninhas para poucas horas após o tratamento, e a morte completa ocorre dentro de 15 a 25 dias.

Para garantir a eficácia total do produto, o adjuvante Trend® 90 deve ser adicionado à calda de pulverização. Não é recomendado o tratamento de plantas sob estresse.

Evorelle® Express® – uma nova solução para desafios sérios

Evorelle® Express® é um herbicida de ação combinada, destinado ao controle eficaz de plantas daninhas de folha larga resistentes no girassol. Evorelle® Express® é particularmente adequado em condições onde há disseminação de plantas daninhas de difícil controle, como **cânhamo-de-cão, cardo-rasteiro, estramônio, ançarinha-branca, capim-massambará** e várias **espécies de quinoa**. O produto penetra rapidamente no tecido das plantas daninhas, bloqueando os processos enzimáticos associados ao crescimento. Os sintomas visíveis aparecem dentro de dez dias após o tratamento, e a morte das espécies suscetíveis ocorre dentro de 15–25 dias.

O controle de plantas daninhas cria um ambiente favorável, mas o crescimento também requer nutrição equilibrada. Os fertilizantes foliares e bioestimulantes da FMC – **Rhizomagic, Seamac™ OR, Nuvola™ AMIN e BO-LA™** – fornecem às plantas os nutrientes necessários, aminoácidos e compostos bioativos que suportam o crescimento, aumentam a tolerância e compensam condições de estresse. Alguns deles, incluindo Rhizomagic, Seamac™ OR e Nuvola™ AMIN, estão incluídos na lista da Agência Búlgara de Segurança Alimentar (BFSA) de fertilizantes orgânicos e organominerais registrados e são **adequados para uso em esquemas ecológicos**.