

No final de abril – tempo instável com precipitação e condições para a formação de geada

Автор(и): Растителна защита

Дата: 26.04.2025 Брой: 4/2025



No final de abril, as condições agrometeorológicas serão determinadas por tempo instável e temperaturas próximas das normas climáticas para o terceiro decêndio de abril. As chuvas no final do período passado em muitos locais das regiões ocidentais aumentaram as reservas de humidade nas camadas superiores do solo. Durante os primeiros dias do período, está prevista precipitação e uma melhoria das condições para a vegetação das culturas agrícolas também nas regiões orientais do país.

O desenvolvimento das culturas de cereais de inverno e das culturas de primavera semeadas na segunda metade do período decorrerá sob condições térmicas abaixo do normal. No final de abril, a fase de alongamento do entrenó prevalecerá massivamente no trigo. No início de maio, na cevada, em alguns locais das regiões de campo, também será observado o início do espigamento. Nas searas semeadas de girassol e milho, dependendo das datas de sementeira, ocorrerão a emergência e a formação inicial das folhas.

Pragas no milho



Gorgulho-cinzento-do-milho (Tanymecus dilaticollis Gyll.)

Nos estágios iniciais da vegetação do milho e do girassol, as searas devem ser monitorizadas quanto à presença de uma praga perigosa – o gorgulho-cinzento-do-milho. Quando a densidade da praga exceder o Nível de Dano Económico (NDE), as culturas devem ser tratadas na primeira oportunidade com um dos inseticidas registados (NDE na fase de emergência: girassol – 2 besouros por m²; milho > 2 besouros por m²).



Mildio da videira (Plasmopara viticola)

Na videira, ocorrerá a formação da 2^a–3^a folha, e nas regiões extremamente meridionais o aparecimento das inflorescências. Durante este período, é aconselhável realizar pulverizações preventivas das videiras contra os agentes causadores do míldio e do oídio.

Práticas de proteção de plantas em culturas hortícolas em abril

No final de abril, está prevista uma diminuição substancial das temperaturas mínimas e condições para a formação de geadas, o que deve ser tido em conta ao plantar mudas de hortícolas em jardins.