

Na última semana de maio, o desenvolvimento das culturas agrícolas ocorrerá sob temperaturas abaixo das normas climáticas e com precipitações economicamente significativas.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.05.2025 *Брой:* 5/2025



Durante o próximo período de sete dias, as condições agrometeorológicas continuarão a ser determinadas por tempo instável. Está prevista precipitação de significado agrônômico para o período, bem como uma melhoria das reservas de humidade do solo, mesmo nas camadas mais profundas.

A precipitação durante a primeira e segunda décadas de maio foi distribuída de forma desigual. Em muitos locais do sul da Bulgária, a precipitação de maio atingiu e excedeu as normas mensais (Blagoevgrad, Haskovo, Kardzhali, Elhovo, Chirpan, Karnobat, Burgas). Em parte das regiões sul, as reservas de humidade do solo nas camadas de 50 e 100 cm atingiram níveis até e acima de 85% da capacidade de campo (CC), ótimos para o desenvolvimento das culturas cerealíferas de inverno e das culturas de primavera semeadas.

Em contraste com as regiões sul, em locais do nordeste da Bulgária (estação agrometeorológica de Silistra), como resultado da precipitação abaixo do normal em abril e na primeira metade de maio, o nível das reservas de humidade do solo para as culturas cerealíferas de inverno no final da segunda década é baixo – abaixo de 65% da CC.

Durante a última semana de maio, espera-se uma melhoria substancial nas reservas de humidade do solo nas regiões nordeste, o que é de grande importância para as culturas cerealíferas de inverno, que têm elevadas exigências de humidade do solo.

Durante o período, o desenvolvimento das culturas agrícolas prosseguirá com temperaturas abaixo das normas climáticas. Até ao final de maio, ocorrerá a formação e o enchimento do grão nas culturas cerealíferas de inverno.



Durante este período interfásico, os danos no trigo são causados pelas larvas do percevejo-dos-cereais, o que torna necessária a inspeção de campo das searas, e quando a densidade da praga excede o limiar económico de dano (2 larvas/m²), o tratamento deve ser realizado na primeira oportunidade.

No girassol e no milho, ocorrerá a formação das folhas.

No final de maio, predominará a floração das inflorescências na videira, uma fase crítica para a infeção com o míldio e o oídio.

Durante a última semana de maio, o aumento do teor de humidade nas camadas superiores do solo restringirá a realização das operações de cultivo sazonais. É esperado granizo durante o período. Para as árvores de fruto, culturas hortícolas e vinhas afetadas pelo granizo, é aconselhável realizar tratamentos com fungicidas à base de cobre para reduzir o risco de infeções secundárias por patógenos.

Fonte: NIMH