

Atividades Agrotécnicas no Pomar em Junho

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 06.06.2025 *Брой:* 6/2025



Na maioria dos dias de junho, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas acima das normas climáticas e precipitação em torno e abaixo da norma mensal. A temperatura média mensal para a maior parte do país estará entre 25 e 26 °C, com temperaturas tradicionalmente ligeiramente mais altas no vale do rio Struma - cerca de 27 °C, e nas áreas de Ruse e Vidin – 26-27 °C. As temperaturas mais baixas durante o mês estarão entre 12 °C e 15 °C, e as mais altas - entre 32 °C e 35 °C, com valores de até 37 °C possíveis em regiões individuais.

Em relação à precipitação, este ano o mês deverá ser semelhante a maio. Os volumes normais de precipitação nas planícies variam de 40 a 90 l/m², na Pré-Balcânica e nas montanhas - de 95 a 100 l. No final do mês, a seca é frequentemente observada, mas este ano o período de seca será na primeira dezena do mês.

No início de junho, prevê-se um aumento significativo das temperaturas e uma aceleração nas taxas de desenvolvimento das culturas agrícolas. A precipitação esperada na segunda metade da primeira dezena manterá um bom nível de reservas de humidade nas camadas de solo de 50 cm e 100 cm. A chuva significativa no final de maio melhorou as reservas de humidade do solo, e na maioria das áreas de cultivo, elas atingiram níveis até e acima de 85% da CC.

O tempo ensolarado prevalecerá sobre o país, mas até o meio-dia; as tardes verão precipitação e trovoadas, localmente, principalmente sobre as montanhas. Em muitos lugares na Bulgária Ocidental e regiões montanhosas, são possíveis chuvas de curta duração acompanhadas de atividade de trovoadas nas horas da tarde. A probabilidade de precipitação é menor nas regiões orientais e nas planícies. As temperaturas no país estarão entre 28-32 °C. Uma massa de ar relativamente mais quente será transportada, e até meados da primeira dezena, as temperaturas excederão 32 °C. Esperamos um aumento significativo das temperaturas por volta de 5 a 9 de junho. Nesse período, a atmosfera estará instável, e a precipitação, embora localizada, é esperada. As temperaturas esperadas estarão entre 32-35 °C. As altas temperaturas também são um pré-requisito para fenômenos extremos, especialmente sobre a Bulgária Ocidental e Noroeste, com esses fenômenos provavelmente acompanhados de granizo grande. Uma nova diminuição das temperaturas, embora leve, ocorrerá no final da primeira dezena.

Condições térmicas acima do normal também são previstas para a segunda dezena de junho. A segunda dezena começará com mais horas de sol. O tempo em geral será predominantemente ensolarado e quente. Condições para precipitação mais significativa existirão por volta de 13 e 17 de junho. Os dias começarão com mais horas de sol. Nas horas da tarde, principalmente nas montanhas, nuvens cúmulos se desenvolverão, e choverá e trovejara em mais lugares. A probabilidade de precipitação é menor na Planície do Danúbio e na Bulgária Oriental. As temperaturas diurnas estarão entre 32-36 °C, e na Bulgária Oriental ligeiramente mais baixas – até 25-30 °C. Em meados da segunda dezena de junho, a atmosfera se desestabilizará, e a precipitação ocorrerá em mais lugares.

Durante a terceira dezena de junho, o desenvolvimento das culturas agrícolas ocorrerá a temperaturas próximas das normas climáticas. Nos primeiros dias da terceira dezena, o tempo estará instável, mas permanecerá quente para o período. Em muitos lugares, nuvens cumulonimbus se desenvolverão, e chuvas de curta duração com trovoadas cairão durante a tarde. Nos últimos dias do mês, espera-se a estabilização da massa de ar e um aumento das temperaturas. Até o final do período, a precipitação diminuirá e as temperaturas subirão. Um período de seca também é esperado, com precipitação observada em menos lugares. Os valores diurnos estarão entre 32-37 °C.

Em viveiros de frutas

Os canteiros são fertilizados com 6-8 kg de nitrato de amônio ou a mesma quantidade de outro fertilizante nitrogenado por decáre e cultivados. Se necessário, é realizada a irrigação.

As plantas-mãe são fertilizadas com 10-15 kg de nitrato de amônio ou a mesma quantidade de outro fertilizante nitrogenado por decáre e amontoadas. Se necessário, são irrigadas antes do amontoamento.

A desbrota é realizada em viveiros para facilitar o crescimento normal dos enxertos. Os porta-enxertos e viveiros são preparados para a enxertia.

Em pomares de frutas

Cuidado é tomado para garantir que as amarras nos ramos de árvores frutíferas re-enxertadas e formas selvagens não se incisem; se necessário, elas são afrouxadas prontamente. Brotos competitivos que cresceram da planta-mãe devem ser removidos em tempo hábil. Árvores recém-plantadas são cultivadas regularmente. Se necessário, são regadas.

Após a segunda dezena, as jovens plantações de frutas são fertilizadas com 15-20 kg de nitrato de amônio por decáre ou a mesma quantidade de outro fertilizante nitrogenado, e é realizado um cultivo superficial do solo.

Ao formar uma palmeta, os ramos esqueléticos são dobrados quando atingem um comprimento total de 2 – 2,5 m para o primeiro nível, 1,5-2 m para o segundo, e 1 m para o terceiro. Para árvores de crescimento fraco, são colocados num ângulo de $45-50^{\circ}$, e para as de crescimento forte – a $45-45^{\circ}$ em relação à horizontal. Quando há ramos esqueléticos de diferentes comprimentos num mesmo nível, apenas o forte é dobrado, enquanto o fraco é deixado para crescer e é dobrado mais tarde.

A raleadura mecânica dos frutos de pêssego continua.

Em áreas com irrigação garantida, realiza-se a semeadura de culturas para adubação verde.



Inicia-se a colheita em massa de cerejas e ginjas

Em plantações de morango

As últimas mudas de morango armazenadas em refrigerador são plantadas. A manutenção para a remoção de ervas daninhas em culturas jovens e recém-plantadas continua. Se necessário, é realizada a irrigação.

A colheita continua. Não colha durante as horas quentes do dia ou quando houver orvalho. Para consumo fresco, são colhidos juntamente com o cálice do fruto.

Em áreas de cultivo mais quentes, após a colheita dos últimos frutos, a palha é imediatamente recolhida e removida. As plantações são fertilizadas com 8-10 kg de nitrato de amônio ou a mesma quantidade de outro fertilizante nitrogenado por decárea, e é realizado o primeiro cultivo pós-colheita. Se a irrigação for necessária, ela é feita antes da fertilização.

Em plantações de framboesa

Realiza-se o cultivo regular do solo e, se necessário, a irrigação. Em plantações frutíferas, continua a limpeza das fileiras de brotos muito fracos e em excesso. A estrutura de arame é mantida forte.



Em algumas regiões, a colheita de variedades precoces de frutos começa por volta de meados de junho.

Quando o amadurecimento começa, as colônias de abelhas são transferidas para outras plantações, mas a uma distância não inferior a 5 km.

Em plantações de groselha-negra

O solo nos canteiros de enraizamento é cultivado 2-3 vezes dependendo da irrigação, da chuva e da presença de ervas daninhas. O cultivo regular é realizado tanto em plantações jovens quanto em frutíferas. Por volta da metade do mês, a colheita de frutos começa em algumas áreas de cultivo mais quentes.

Em plantações com outras culturas

A enxertia de porta-enxertos de limão em gemas ativas continua.

Continua o cuidado com as estacas de romã, figo e espinheiro-marítimo em solo aberto, com o viveiro sendo regularmente cultivado e regado. São realizados os tratamentos necessários contra as ervas daninhas.

No final do mês, os porta-enxertos não enxertados do ano passado são enxertados com gemas ativas de aqui.



A amarração das videiras de kiwi a estacas auxiliares continua. A fertilização é realizada com o último 1/3 da norma anual de nitrogênio especificada para o kiwi. Os brotos laterais no caule principal do kiwi são removidos para estimular seu desenvolvimento e modelagem geral. É moldado como a letra T.