


Fator limitante para o desenvolvimento de culturas agrícolas tardias em agosto permanece o déficit de umidade do solo

Автор(и): Растителна защита

Дата: 05.08.2025 *Брой:* 8/2025



Em agosto, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas acima das normas climáticas e precipitação – em torno e abaixo da norma mensal. O déficit de humidade do solo permanecerá um fator limitante para o desenvolvimento das culturas agrícolas tardias também em agosto.

A precipitação que caiu no final de julho, após o agravamento da seca, foi local e insuficiente para superar o déficit hídrico nas culturas agrícolas tardias. Na maioria das regiões agrícolas, a humidade produtiva está ausente nas camadas de solo de 50 e 100 cm.

Durante a maioria dos dias de agosto, o tempo relativamente seco previsto exigirá a aplicação de taxas de rega aumentadas para as segundas culturas e híbridos de milho tardios. Taxas de rega aumentadas também serão necessárias para as árvores de fruto, que estão em processo de formação de gemas florais para o próximo ano.

A nova geração de híbridos de girassol do DAI é um formato altamente intensivo para a gestão do rendimento

Em agosto, mais cedo do que os prazos habituais para o país, será concluído o desenvolvimento das culturas de primavera tardias. No início de agosto, nas culturas de girassol no Sul da Bulgária, será observada a maturidade técnica (Plovdiv, Haskovo, Sliven, Yambol), e no final da primeira e início da segunda década - também nas searas numa grande parte das regiões agrícolas. Os híbridos de milho mais precoces cultivados em condições de rega entrarão nas fases de maturação cerosa e plena durante a primeira década. Os híbridos médio-tardios completarão o seu desenvolvimento na terceira década de agosto.

Devido às condições agrometeorológicas desfavoráveis na primeira metade do verão, com seca prolongada e temperaturas extremamente elevadas, são esperados baixos rendimentos de milho e girassol.

As temperaturas persistentemente elevadas em julho, que continuarão em agosto, ameaçam seriamente a colheita das culturas de primavera.

O único centro de melhoramento de girassol no país é o Instituto Agrícola da Dobrudja, onde os esforços de melhoramento estão focados na criação de novas variedades de girassol resistentes ao orobanche, ao míldio e à seca. Um dos novos híbridos do Instituto – “Dara”, adequado para cultivo usando a tecnologia “Express” e resistente ao míldio até à raça 731 e ao orobanche até à raça G, tem um desempenho muito bom em condições de seca e altas temperaturas.

Em agosto, estão previstas temperaturas máximas na faixa de 35–40°C. Estes valores terão um impacto negativo na floração e fertilização em culturas hortícolas de produção tardia (pepinos, feijão verde, curgetes).

As condições meteorológicas durante o mês limitarão o desenvolvimento de doenças fúngicas, com exceção dos oídios nas culturas hortícolas, árvores de fruto e videiras. É esperado um aumento nas populações de ácaros. Nas vinhas, é necessário monitorizar a densidade das lagartas da terceira geração da traça-da-uva.

Quando necessário, a pulverização fitossanitária em agosto deve ser realizada durante as horas mais frescas do dia (a temperaturas inferiores a 25°C), utilizando produtos com um intervalo de segurança apropriado, de acordo com o período de maturação das culturas.

Fonte: NIMH