

# Atividades agrotécnicas no pomar em agosto

*Автор(и):* ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

*Дата:* 07.08.2025 *Брой:* 8/2025



Em agosto, o crescimento dos rebentos está concluído. Os frutos das variedades de outono de maçãs, peras e pêssegos aumentam intensamente de tamanho, paralelamente ao processo de diferenciação das gemas frutíferas. As árvores estão a ser abastecidas com nutrientes de reserva.

As condições agrometeorológicas durante o mês serão determinadas por temperaturas próximas e acima das normas climáticas. Em agosto, são previstas temperaturas máximas na faixa de 35-40°C. O fator limitante para o desenvolvimento das culturas durante o mês permanece o déficit de humidade do solo.

No início da segunda década, o tempo permanecerá predominantemente solarengo, com nebulosidade alta durante a tarde. As temperaturas estarão próximas da norma climática — entre 31 e 34°C. Estará ventoso na

Planície do Danúbio. Por volta de 13–15 e 17-22 de agosto, é esperada a passagem de uma nova frente fria, o que levará a uma diminuição das temperaturas, bem como a precipitação e trovoadas. Após o breve arrefecimento, até ao final da década haverá novamente aquecimento, mas com maior probabilidade de precipitação à tarde. Para o final do mês, é esperada uma diminuição duradoura das temperaturas.

Durante a maioria dos dias de agosto, a previsão de tempo relativamente seco exigirá a aplicação de taxas de rega aumentadas para as variedades mais tardias de árvores de fruto.

### *Em viveiros de árvores de fruto*

Os canteiros de sementeiras são cultivados e regados.



### *Borbulhação de porta-enxertos*

Em canteiros de viveiro do primeiro ano, continua a borbulhação dos porta-enxertos. Em canteiros de viveiro do segundo ano, se necessário, é realizada a última desbrota dos porta-enxertos abaixo do ponto de borbulhação.

As plantações-mãe são inspecionadas e todas as plantas atípicas são arrancadas. Os lugares são prontamente preenchidos com plantas da espécie principal.

Até ao final de agosto, podem ser enxertadas árvores de macieira, pereira, pessegueiro e cerejeira. Durante a segunda e terceira décadas do mês, inicia-se a enxertia de marmeleiro.

Os porta-enxertos borbulhados em julho são inspecionados e, no caso de boa união entre o enxerto e o porta-enxerto, as amarrações são removidas.

### *Em pomares de árvores de fruto*

A humidade do solo é monitorizada e a rega é realizada quando necessário. Após a chuva ou rega, é realizada uma cultura superficial do solo para quebrar a crosta formada.

É realizado o controlo mecânico de infestantes nas entrelinhas, se não estiverem relvadas, e nas faixas junto às árvores.



Continua a colheita de pêssegos e das variedades precoces de maçãs, peras e ameixas. No final do mês, também são colhidos os frutos de algumas variedades precoces de noqueira.

São realizados os trabalhos organizacionais necessários para preparar a colheita das variedades de meia-estação e tardias de maçãs, peras e ameixas.

Os armazéns de fruta são desinfetados e preparados para receber a nova produção. As máquinas para calibragem de fruta são reparadas e preparadas para funcionamento.

Inicia-se a preparação pré-plantio das áreas para estabelecimento de novos pomares – aração profunda, fertilização de fundo e nivelamento.

### *Em plantações de morangueiro*



É muito importante que todas as plantações de morangueiro sejam regadas de forma atempada. Não deve ser permitido o secamento das folhas. Em agosto, as plantas formam a produção para o ano seguinte e deve ser mantido um regime hídrico ótimo. Dependendo da idade da plantação e do tipo de solo, são realizadas 2-3 regas. Os estolhos das plantas das quais não se pretende obter material de plantação são cortados.

Cuidam-se das plantações-mãe – controlo de infestantes, rega e cultivo do solo.

Continua a preparação de novas áreas para a plantação de outono de morangueiros. Em algumas regiões mais altas, a plantação pode começar.

### *Em plantações de framboeseira*

Continua o cuidado com as plantações recém-estabelecidas – a rega é realizada quando necessário e, se houver infestantes, é feita a culturação. As plantações em frutificação são regadas para que os frutos possam aumentar de tamanho e se possam formar gemas floríferas para a próxima colheita. Para o final do mês, as regas são interrompidas para que os novos sarmentos de substituição possam amadurecer.

Continua o cuidado com as plantações-mãe – rega, adubação de cobertura com fertilizantes azotados e culturações. Para o final de agosto, as regas são descontinuadas para que os sarmentos possam amadurecer.



Continua a colheita. Até ao final do mês, todos os sarmentos que frutificaram são cortados, removidos e queimados.

Estão a ser preparados os locais para as novas plantações a estabelecer no outono. O solo é fertilizado com 3-5 t de estrume, 80-100 kg de superfosfato (ou a mesma quantidade de outro fertilizante à base de fósforo), 25-30 kg de sulfato de potássio (ou a mesma quantidade de outro fertilizante à base de potássio) por decaire.

#### *Em plantações de groselheira-preta*

Continua o cuidado com os canteiros de multiplicação e com as plantações jovens. Não é permitido o secamento e a infestação do solo por ervas daninhas. Em caso de crescimento fraco das plantas nos canteiros

de multiplicação e nas plantações jovens, é realizada uma adubação de cobertura com 10-15 kg de nitrato de amónio (ou a mesma quantidade de outro fertilizante azotado) por decare.



A colheita dos frutos em locais mais altos está concluída. As plantações são regadas e regularmente cultivadas.

### *Em plantações com outras culturas*

É realizada a borbulhação de verão dos porta-enxertos para dióspiro, actinídia (kiwi), jujuba e pistácio. 5-6 dias antes da enxertia, o viveiro é abundantemente regado para melhor descasque da casca.

3-5 dias antes da borbulhação, são recolhidos os garfos e mantidos à sombra numa sala fresca.

Verifica-se a pega das plantas borbulhadas de dióspiro e outras.

O limoeiro é borbulhado com uma gema dormente. As plântulas de limoeiro são abundantemente regadas uma semana antes da enxertia e imediatamente após a mesma.

Continua a marcação das variedades e formas desejadas de figueira, romãzeira, etc.

Continua o enraizamento de estacas verdes de actinídia, aronia, espinheiro-marítimo e romãzeira.

Continua o cuidado com a rega e a sacha das plantações com culturas do sul, com particular atenção às recém-estabelecidas.

Continua a colheita de frutos de figueira, espinheiro-marítimo e aronia.