

Em setembro, não se espera precipitação de significado agrícola, e as condições permitirão a formação de rendimento adicional de culturas hortícolas tardias.

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.09.2025 Брой: 9/2025*



Em setembro, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas acima das normas climáticas e precipitação em torno e abaixo da norma mensal.

Após o agravamento da seca, as chuvas no final de agosto foram localizadas e apenas em certos locais das regiões central e leste é que umedeceram a

camada superior do solo. Na maioria das regiões agrícolas, a umidade produtiva está ausente nas camadas de solo de 50 e 100 cm.

Durante a primeira e a segunda décadas de setembro, não são previstas precipitações de significado agrônômico, e em muitos locais das regiões agrícolas o solo seco e compactado dificultará a realização da aração profunda e do preparo pré-plantio das áreas destinadas à semeadura de colza. A probabilidade de atrasos sérios na semeadura desta oleaginosa, que requer técnicas agrônômicas precisas, é alta. O período agrotécnico para a semeadura da colza é do final de agosto ao final da segunda década de setembro.



Em setembro, as condições térmicas acima do normal previstas acelerarão as fases finais de desenvolvimento das culturas agrícolas tardias que superaram os efeitos adversos da prolongada seca estival. No início do mês, os híbridos de milho médio-tardios cultivados em condições de irrigação estarão em maturação cerosa e plena, enquanto os híbridos tardios estarão em transição da maturação leitosa para a cerosa.

Na maioria dos dias do mês, o tempo relativamente seco e quente previsto para o final do verão e início do outono proporcionará condições adequadas para a colheita da uva. Como resultado das temperaturas estivais acima do normal, as variedades tardias de uvas para vinho atingirão a maturidade tecnológica mais cedo do que as datas habituais.

As condições meteorológicas em setembro limitarão o desenvolvimento de doenças fúngicas, com exceção dos oídios. Para as culturas hortícolas de produção tardia em campo aberto, a pulverização de proteção de plantas contra ácaros, traça-das-crucíferas e lagarta-do-fruto-do-algodoeiro, que causam danos e deterioram a qualidade da produção hortícola, não deve ser subestimada.

Durante o mês, a atividade nociva de grande parte das pragas nas fruteiras chega ao fim. No final de setembro, é aconselhável inspecionar os pomares de pereira para verificar a presença do gorgulho-das-gemas-da-pereira. O controle desta praga é eficaz apenas contra os adultos no início do outono. Quando a densidade da praga ultrapassa o limite econômico de dano (3 besouros por árvore), o tratamento deve ser realizado.

Como resultado das temperaturas estivais acima do normal, algumas das variedades precoces de árvores frutíferas de outono não afetadas pelas geadas da primavera atingirão a maturidade de colheita (maçãs: Golden Parmena, Jonathan, Red Delicious, Golden Delicious, Canadian Reinette, etc.).

Em setembro, não são previstas temperaturas mínimas críticas, e as condições permitirão a formação de produção adicional a partir de culturas hortícolas tardias suscetíveis à geada.