

Outubro – Anomalias Climáticas e um Início Mais Tardio da Sementeira de Outono de Culturas de Cereais de Inverno

Автор(и): Растителна защита

Дата: 12.10.2025 Брой: 10/2025



Durante os primeiros dez dias de outubro, as condições agrometeorológicas serão determinadas por um tempo instável e temperaturas médias diárias em torno e abaixo das normas climáticas. Durante este período de dez dias, não são previstas temperaturas mínimas críticas para culturas hortícolas de produção tardia nas áreas de campo, o que é um pré-requisito para a colheita de produtos adicionais de culturas sensíveis à geada (tomates, pimentões, abobrinhas, pepinos, etc.).

Durante este período, prevê-se uma precipitação economicamente significativa, melhorando a condição das camadas superiores do solo e as condições para a realização da mobilização sazonal do solo. A seca no final do verão e início do outono em muitas partes do país dificultou o cultivo pré-sementeira das áreas destinadas às culturas de outono.

A forte precipitação durante os primeiros dez dias de outubro, que em muitos locais do país ultrapassou o dobro, e no Norte da Bulgária – o triplo das normas climáticas: Lovech - 152 l/m² (296%), Pleven - 167l/m² (342%), V. Tarnovo - 187l/m² (351%), Razgrad - 171 l/m² (302%), Ruse - 254 l/m² (450%), saturou excessivamente as camadas superiores do solo e aumentou as reservas de humidade nas camadas de 50 e 100cm.

Início da Sementeira de Outono



Condições agrometeorológicas desfavoráveis – a seca e a subsequente precipitação excessiva durante os primeiros dez dias de outubro dificultaram o cultivo sazonal do solo, e em algumas regiões do país, como a Bulgária Ocidental, a sementeira de culturas de grão de inverno está a ser atrasada, embora o início oficial da sementeira de outono já tenha sido dado.

Os primeiros dez dias de outubro são o prazo agrotécnico para a sementeira do trigo no Norte da Bulgária, de 15 a 25.X - no Sul da Bulgária, e no final do mês - nas regiões costeiras do Mar Negro. De acordo com dados

do Ministério da Agricultura e Alimentação, a sementeira do trigo está atrasada em mais de 52%, com menos áreas semeadas no país em comparação com o mesmo período do ano passado. Um atraso é também observado para a cevada e o centeio, mas em menor extensão.

Possibilidades de Uso e Aplicação de Triticale

De acordo com dados do Ministério da Agricultura e Alimentação, observa-se um aumento significativo das áreas de triticale na campanha de sementeira de outono deste ano – quase 54% mais em comparação com o ano anterior. Em 2024, as áreas com esta cultura eram de 102 xa nesta altura do ano, enquanto atualmente, os campos semeados com triticale são de 167 xa.

O interesse por esta cultura, que é um híbrido intergenérico de trigo e centeio, tem crescido nos últimos anos devido à sua combinação do alto potencial de rendimento do trigo e da resistência a doenças do centeio.



Uma tendência conhecida de aumento das áreas de colza tem sido observada nas últimas temporadas. Este ano, o crescimento da cultura durante a sementeira de outono é de 39% em comparação com os dados da campanha do ano passado. Até hoje, os campos semeados com colza excedem 73,3 mil hectares.

Na maioria dos dias do segundo e terceiro períodos de dez dias, as condições agrometeorológicas serão determinadas por um tempo relativamente seco e temperaturas próximas do normal. Há uma alta probabilidade de que as fases iniciais de vegetação para as culturas de grão de inverno semeadas no final de outubro prossigam com déficit de humidade. No final do mês, para trigo e cevada, dependendo das datas de sementeira, serão observadas as fases de emergência e formação de 1-2 folhas.

Durante este período, as condições serão adequadas para completar a vindima, para a colheita de variedades de outono de árvores de fruto, e no final de outubro – também para a realização de atividades fitossanitárias. Para pomares de maçã e pera afetados por sarna, para reduzir a infeção, é aconselhável tratar com uma solução de ureia a 5% no início da queda das folhas, após a colheita dos frutos.

Para espécies de frutos de caroço, após a queda massiva das folhas, recomenda-se a pulverização com uma calda bordalesa a 2% contra os agentes causadores da doença do crivado, podridão parda precoce, crespadeira do pessegueiro, etc.