

Na segunda quinzena de novembro, haverá condições para a realização de atividades agrotécnicas sazonais e plantio de árvores frutíferas

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.11.2025 Брой: 11/2025



As condições agrometeorológicas em novembro serão determinadas por temperaturas próximas e acima das normas climáticas e precipitação em torno e abaixo da norma para o mês.

Até o final do primeiro e início do segundo decêndio de novembro, as condições agrometeorológicas serão determinadas por tempo instável. A precipitação no final do último período de sete dias e a esperada durante o

próximo atrasarão ainda mais, além dos prazos agrotécnicos, a semeadura do trigo. Até agora, cerca de metade das áreas planejadas foram semeadas.

A precipitação em outubro, que excedeu as normas climáticas em duas a três vezes (Sófia, Pleven, Lovech, V. Tarnovo, Razgrad, Ruse, Pazardzhik, Stara Zagora, Burgas), manteve um alto teor de umidade nas camadas superiores do solo, o que atrasou o cultivo pré-semeadura e a semeadura de cereais de inverno. Devido a esta razão objetiva, na maior parte do país, com exceção de algumas áreas na Planície do Danúbio e nas regiões orientais, os prazos agrotécnicos para a semeadura do trigo em outubro foram perdidos. Uma parte significativa das áreas planejadas para cereais de inverno será semeada em novembro. Há uma alta probabilidade de que as culturas de novembro não consigam entrar na fase de afilamento, a fase adequada para o inverno, até o final de sua vegetação de outono.

Durante a maioria dos dias de novembro, são previstas temperaturas diárias médias acima do normal, o que manterá os processos de vegetação ativos nas culturas de outono. No final do mês, diferentes fases serão observadas no trigo e na cevada, dependendo das datas de semeadura. Para as culturas semeadas em novembro, ocorrerá a germinação e a formação de folhas (1-2-3 folhas). Em uma pequena parte das culturas de trigo em algumas áreas da Planície do Danúbio e nas regiões orientais (Dobrich, General Toshevo, Tervel, Provadia, Karnobat), que foram semeadas no início do outono, será observado o início da fase de afilamento.



A praga mais perigosa das culturas de cereais é o besouro-do-solo-dos-cereais comum (Zabrus tenebrioides), que ataca trigo, cevada, milho, aveia e várias gramíneas de cereais.

Nas fases iniciais da vegetação do trigo e da cevada, as culturas devem ser inspecionadas quanto a pragas. Os danos são causados pelo rato-do-campo comum, pelas larvas do besouro-do-solo-dos-cereais e pelas moscas dos cereais, e se a densidade estiver acima do NDE (Nível de Dano Econômico), a proteção fitossanitária oportuna é necessária.



Em novembro, serão criadas condições mais adequadas para o plantio de árvores frutíferas e para a realização de atividades fitossanitárias em culturas frutíferas durante o segundo decêndio. Para espécies de pomáceas (maçã, pera) afetadas pela sarna, recomenda-se o tratamento com uma solução de ureia a 5%. Para espécies de frutas de caroço, é aconselhável pulverizar com uma calda bordalesa a 2% contra os agentes causadores da perfuração das folhas, podridão parda precoce e crespadeira do pessegueiro.