

Dezembro – temperaturas atipicamente altas e precipitação localizada

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.12.2025 Брой: 12/2025



O tempo quente para a estação durante a maior parte de novembro e a presença de reservas de humidade do solo muito boas criaram condições para o progresso no desenvolvimento das culturas de outono semeadas tardiamente, após os prazos agrotécnicos.

No início de dezembro, as temperaturas acima do normal previstas prolongarão os processos de vegetação dos cereais de inverno nas regiões de campo do país.

A precipitação generalizada no início do período aumentará o nível das reservas de humidade de outono na camada de solo de 100 cm. Devido à precipitação acima do normal em outubro e novembro, as reservas de

humidade do solo na camada de um metro para os cereais de inverno na maioria das regiões de campo atingiram níveis de até 90% da CC (capacidade de campo).

No final do período de dez dias, as condições agrometeorológicas continuarão a ser determinadas por temperaturas elevadas para a estação. Nas regiões orientais, preveem-se valores máximos superiores a 14-15°C, com probabilidade de provocar um inchaço indesejável e prematuro dos gomos em algumas espécies de fruteiras de floração precoce, o que levaria a uma redução da sua resistência à geada.

Condições adequadas para a conclusão das pulverizações de proteção fitossanitária de outono em árvores de fruto contra patógenos e pragas hibernantes serão criadas durante a segunda metade do primeiro período de dez dias do mês.

Uma diminuição das temperaturas, atenuação e cessação da vegetação para trigo e cevada são esperadas no final do primeiro período de dez dias de dezembro.

Durante o segundo e o início do terceiro período de dez dias, as temperaturas médias diárias previstas excederão as normas climáticas, mas permanecerão dentro dos limites que manterão os cereais de inverno em dormência.

No início do inverno, o estágio da terceira folha predominará para o trigo. Uma pequena parte das culturas em algumas regiões orientais e no extremo sul do país, que foram semeadas a tempo - em outubro, estará na fase de afilhamento, adequada para a hibernação. Os cereais de inverno semeados tardiamente, durante a segunda quinzena de novembro, entrarão no inverno subdesenvolvidos, no estágio inicial de formação da folha (1-2 folhas). A razão para as diferenças significativas no estado fenológico das culturas é a semeadura tardia devido às condições desfavoráveis no início do outono – após a seca e a subsequente precipitação acima do normal em outubro.

No final de dezembro, espera-se um aumento das temperaturas, mas os seus valores médios diários permanecerão abaixo do mínimo biológico necessário para a retomada dos processos de vegetação nas culturas de outono.

Durante o mês, as temperaturas mínimas previstas, até menos 10°C, em condições sem cobertura de neve, se sustentadas por um período mais longo, serão críticas para as culturas no estágio inicial de formação da folha.

A precipitação esperada em dezembro, próxima da norma mensal, aumentará as reservas de humidade na camada de solo de 100 cm para níveis próximos da CC (capacidade de campo).

