

Em fevereiro, as condições agro-meteorológicas variarão do inverno à primavera

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.02.2026 Брой: 2/2026



Após o clima ameno de final de janeiro e início de fevereiro, as condições agrometeorológicas voltarão a adquirir um caráter de inverno.

O resfriamento esperado restabelecerá a dormência nas culturas de outono nas regiões sul e leste e conterà o inchaço prematuro das gemas em algumas espécies de frutas de caroço de floração precoce.

A precipitação de neve esperada formará uma cobertura de neve, que proporcionará proteção para as culturas de cereais de inverno de semeadura tardia contra as temperaturas mínimas baixas previstas - até menos 11-

12°C. Estes valores, na ausência de cobertura de neve e com uma duração mais prolongada, são críticos para parte das culturas em sobrevivência no estágio de 1-2 folhas (Estação Agrícola de Nikolaevo).

Durante a segunda metade da primeira e ao longo da segunda década, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas próximas e acima das normas climáticas. Na maioria das regiões de campo, exceto em áreas do sul da Bulgária e ao longo da costa do Mar Negro, as temperaturas médias diárias previstas não excederão o mínimo biológico necessário para a retomada dos processos vegetativos nas culturas de cereais de inverno.

Durante a terceira década de fevereiro, prevê-se um aumento substancial da temperatura, e condições para vegetação atrasada nas culturas de outono serão criadas nas regiões leste e sul. Até o final do mês, o estágio da terceira folha predominará no trigo. Parte das culturas na Planície do Danúbio, nas regiões extremo leste e sudoeste (Novachene, Silistra, D. Chiflik, Karnobat, Sandanski) estão em sobrevivência no estágio de perfilhamento.

As temperaturas acima do normal durante a terceira década deverão provocar desenvolvimento prematuro também em algumas espécies de frutas de caroço de floração precoce (amêndoa, damasco, pêssego) nas regiões sul do país.

Em fevereiro, a precipitação acima do normal esperada aumentará as reservas de humidade do solo na camada de dois metros. As reservas de humidade na camada de um metro do solo no final de janeiro na maioria das regiões de campo, exceto em áreas do leste da Bulgária (Razgrad, Ts. Brod, D. Chiflik, Sliven, Chirpan), atingiram níveis até a Capacidade de Campo.

Em fevereiro, condições mais adequadas para a realização da poda em vinhas e pomares serão criadas durante a segunda metade do mês, e para a adubação de cobertura das culturas de outono com fertilizantes minerais nitrogenados e para a realização da lavoura pré-semeadura em áreas destinadas à semeadura com culturas de primavera precoces (ervilha, ervilhaca, aveia, cevada de primavera) – durante a terceira década.

Prazos para a Proibição de Fertilizantes com Conteúdo de Azoto

Não se esqueça dos períodos durante os quais é proibida a aplicação de fertilizantes com conteúdo de azoto para culturas de campo e permanentes, pomares, prados e pastagens permanentes, de acordo com a Lei da Água 2 "Proteção das Águas contra a Poluição por Nitratos de Fontes Agrícolas". Este requisito é particularmente importante para os beneficiários das medidas "Agroecologia e Clima" e "Agricultura Biológica",

bem como para todos os agricultores cujas terras se encontrem no âmbito das zonas vulneráveis a nitratos. Estes são obrigados a cumprir a Diretiva Nitratos e as regras da boa prática agrícola.

De acordo com os requisitos, existem períodos específicos durante os quais é proibida a aplicação de fertilizantes com conteúdo de azoto:

- Para o Sul da Bulgária, este é o período de 1 de novembro a 20 de fevereiro e abrange os distritos de Blagoevgrad, Burgas, Kardzhali, Pazardzhik, Plovdiv, Sliven, Smolyan, Stara Zagora, Haskovo, Yambol, Sofia-cidade, Sofia-província, Pernik e Kyustendil;
- Para o Norte da Bulgária, o período é de 1 de novembro a 25 de fevereiro e inclui os distritos de Varna, Vratsa, Veliko Tarnovo, Vidin, Gabrovo, Dobrich, Lovech, Montana, Pleven, Razgrad, Ruse, Silistra, Targovishte e Shumen;
- De 1 de novembro a 5 de fevereiro, não é permitida a fertilização de culturas anuais semeadas no outono;
- De 1 de novembro a 25 de fevereiro – em áreas vagas preparadas para a sementeira e plantio de culturas;
- Na instalação de novos pomares, os fertilizantes com conteúdo de azoto não são aplicados de 15 de novembro a 25 de fevereiro.

A norma anual para fertilizantes com conteúdo de azoto, incluindo orgânicos e minerais (inorgânicos), é de até 17 quilogramas de substância ativa por decaire. Os agricultores são obrigados a manter registos de fertilização, nos quais são anotadas a dose de fertilização, o nome, tipo e quantidade dos fertilizantes aplicados, bem como os resultados de análises preliminares do solo e as recomendações dos especialistas em fertilização.