

No início de março, o alto teor de umidade nas camadas superiores do solo dificultará a semeadura das culturas de primavera precoce.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.03.2026 *Брой:* 3/2026



Durante a primeira década de março, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas acima da média. O tempo quente previsto para o início do mês, com valores máximos acima de 15-16°C, ativará os processos vegetativos nas culturas de outono e nas frutícolas nas regiões de campo do país. Neste período, o estágio da terceira folha prevalecerá nas culturas de trigo nas regiões noroeste, enquanto nas regiões leste e sul, o estágio de afilhamento será dominante.

Nas frutícolas, sem perigo de temperaturas mínimas críticas, ocorrerão os estágios de intumescimento e rebentação das gemas nas espécies de frutas de caroço de floração precoce nas regiões sul.

Não se esperam precipitações significativas durante o período. Devido às precipitações acima da média em fevereiro, as reservas de humidade do solo na camada de 100cm na maioria das regiões de campo atingiram níveis até à Capacidade de Campo. Em partes das regiões sul, onde a precipitação excedeu as normas mensais duas a três vezes (Sliven -111l/m², St. Zagora - 130l/m², Haskovo - 155l/m², Kardzhali - 150l/m², Elhovo - 121l/m², Chirpan - 118l/m²), as culturas cerealíferas de inverno estão sobre-humidificadas.



No próximo período também, o elevado teor de humidade nas camadas superiores do solo em muitos locais do sul da Bulgária dificultará a adubação de cobertura das culturas de outono com fertilizantes minerais azotados e a realização da lavoura pré-sementeira nas áreas destinadas à sementeira com culturas de primavera precoces (ervilhaca, ervilha, cevada de primavera).

Após o esperado breve arrefecimento no final da primeira década, para a maioria dos dias da segunda, estão previstas temperaturas médias diárias acima do mínimo biológico necessário para a vegetação das culturas cerealíferas de inverno.



Durante a terceira década de março, o desenvolvimento das culturas agrícolas prosseguirá sob temperaturas próximas das normas climáticas. Até ao final do mês, o estágio de afilhamento prevalecerá no trigo. Nas culturas cerealíferas de inverno semeadas dentro do prazo agrotécnico, será observado um aumento no coeficiente de afilhamento.

Durante março, ocorrerão as seguintes fases nas frutícolas: intumescimento, rebentação das gemas frutíferas, formação de botões e floração nas espécies de frutas de caroço de floração precoce (amendoeira, damasqueiro, pessegueiro, cerejeira). As temperaturas mínimas previstas durante o mês, até menos 7°C, serão críticas para as árvores frutíferas que tenham entrado nas fases de formação de botões e floração.

A precipitação esperada em março, próxima das normas mensais, manterá boas reservas de humidade do solo para as culturas cerealíferas de inverno. Devido à precipitação acima da média em fevereiro (Shumen -103 l/m², Razgrad -104 l/m², Ruse - 103 l/m², Silistra - 100 l/m², Dobrich - 98 l/m², Haskovo - 155 l/m², Kardzhali - 151 l/m², Sliven -111 l/m², St. Zagora - 130 l/m², Elhovo - 123 l/m², Chirpan - 119 l/m²), as reservas de humidade na camada de 100cm do solo para as culturas de outono atingiram níveis próximos da Capacidade de Campo.

Em meados de março, inicia-se o período agrotécnico (15-20.03) para a sementeira de girassol no sul da Bulgária, e no meio da terceira década (25.03-5.04) – na Planície do Danúbio.

