Растителна защита

електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

# Em outubro: Quais serão as condições agrometeorológicas e quando são as datas ideais de semeadura

**Растителна Защита**

**Data** 09.10.2026 | **Número** 10/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Idioma** PT
www.plant-protection.com/article/2478?lang=pt



Durante os primeiros dez dias de outubro, as condições agrometeorológicas serão determinadas por tempo instável e temperaturas médias diárias em torno e abaixo das normas climáticas. O tempo fresco e úmido previsto na maioria dos dias do período será um pré-requisito para o desenvolvimento de patógenos - podridão parda tardia nos frutos de variedades de outono de árvores frutíferas (Monilia fructigena), mofo cinzento (Botrytis cinerea) na colheita de uva não colhida. Esperam-se geadas massivas no final do período de dez dias, o que exige a colheita oportuna de culturas hortícolas sujeitas a geadas.



*Podridão parda tardia nos frutos de variedades de outono de árvores frutíferas (Monilia fructigena)*

Durante os primeiros dez dias de outubro, prevê-se precipitação, melhoria da condição das camadas superiores do solo e das condições para a realização de lavoura sazonal do solo. A seca no final do verão dificultou a realização da lavoura pré-semeadura das áreas destinadas à semeadura de culturas de in-

verno. Por esta razão, os prazos agrotécnicos em setembro para a semeadura de colza de inverno foram perdidos.



Outubro é a época ideal para a semeadura de cereais de inverno. Durante os primeiros dez dias é o prazo agrotécnico para a semeadura de trigo no norte da Bulgária, de 15 a 25 de outubro - no sul da Bulgária, e no final do mês – nas áreas ao longo da costa do Mar Negro.

As condições agrometeorológicas no período de 9 a 16 de outubro serão dinâmicas. No início deste período de sete dias, as temperaturas médias diárias previstas estarão acima do normal, e durante o restante do período estarão dentro das normas climáticas. No início do período, prevê-se precipitação local e leve no oeste da Bulgária, e em direção ao meio também nas áreas de campo da Bulgária central e oriental. Em alguns lugares os valores serão significativos, o que melhorará a umidificação das camadas superiores do solo. Não se esperam condições para a formação de geadas.

Com exceção de algumas áreas no oeste da Bulgária, durante a primeira metade do período previsto, as condições agrometeorológicas serão adequadas para a colheita final das plantações de uva e frutas, limpeza das áreas de culturas em linha e hortaliças tardias, bem como para o levantamento de forragem e beterraba sacarina, que estão na fase de maturidade tecnológica. As condições serão adequadas para a realização de atividades agrotécnicas relacionadas com a semeadura de cereais de inverno. Em caso de forte infestação de ervas daninhas nas áreas, é aconselhável realizar a aplicação de herbicidas no outono.



Até meados do período, as condições agrometeorológicas permitirão a aplicação de fertilizantes minerais e orgânicos, bem como o plantio pré-invernal de cebola para verde, alho de inverno, alface e espinafre.

As chuvas previstas durante a segunda metade do período previsto limitarão grandemente as possibilidades de realização de atividades agrícolas.

Durante o segundo e terceiro períodos de dez dias, as condições agrometeorológicas serão determinadas por temperaturas próximas das habituais. A precipitação prevista durante a primeira metade do segundo período de dez dias, no início do terceiro e no final do mês, melhorará as reservas de umidade do solo na camada de 50 cm e as condições para o curso das fases iniciais da vegetação das culturas de inverno semeadas. No final de outubro, no trigo e na cevada, dependendo das datas de semeadura, serão observadas as fases de emergência e formação de 1-2-3 folhas.



Em outubro, as culturas de outono são atacadas por pragas. Nos cereais de inverno, a presença de rato comum, besouro-do-trigo comum e moscas-do-trigo deve ser monitorada. Quando o número de pragas excede o limiar econômico de nocividade (LEN), é

ISSN 2815-522X

necessário tratamento oportuno. Para o rato comum, o LEN é de 2 colônias ativas por decare, para o besouro-do-trigo comum - 3 larvas/m².