Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

Durante a segunda metade de novembro, as condições agrometeorológicas permitirão a conclusão das sementeiras de outono, a plantação de árvores de fruto e a realização de atividades fitossanitárias nos pomares.

Растителна Защита

Data 13.12.2026 | **Número** 12/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Idioma** PT
www.plant-protection.com/article/2491?lang=pt



Na maioria dos dias durante a primeira metade de novembro, as condições agrometeorológicas serão determinadas por tempo instável e sazonalmente frio. Durante este período, prevê-se precipitação acima do normal, o que em muitas partes do país atrasará a sementeira do trigo e da cevada. A seca no início do outono dificultou a realização da lavoura pré-sementeira das áreas e, por esta razão, numa grande parte das regiões de campo, os prazos agrotécnicos de outubro para a sementeira das culturas cerealíferas de inverno foram perdidos.

Até meados de novembro, o desenvolvimento das culturas de inverno semeadas prosseguirá a um ritmo retardado. Nos campos altos, onde no início do mês não se exclui precipitação, incluindo neve, os valores previstos das temperaturas médias diárias estarão próximos do mínimo biológico necessário para a vegetação das culturas cerealíferas de inverno.

A precipitação esperada no início e no final do período (13 - 19.11.2026) manterá um elevado teor de humidade nas camadas superiores do solo, o que atrasará ainda mais as medidas agrotécnicas sazonais, das quais a mais importante é a conclusão da sementeira do trigo. A precipitação durante os primeiros dez dias de novembro excedeu 60-70 l/m² em muitas partes do país e aumentou acentuadamente as reservas de humidade nas camadas mais profundas do solo. Numa parte da Planície do Danúbio, nas regiões oriental e meridional (estações agrometeorológicas: Novachene, Nikolaevo, Silistra, Dolni Chiflik, Plovdiv, Haskovo, Yambol, Karnobat), as reservas de humidade do solo na camada de 50 e 100 cm atingiram níveis superiores a 80% da CC (Capacidade de Campo).

Espera-se um aumento das temperaturas e uma mudança positiva das condições agrometeorológicas durante a segunda metade de novembro. Durante este período, os processos de vegetação nas culturas de outono prosseguirão a temperaturas próximas das normas climáticas e com boas reservas de humidade do solo. No final de novembro, no trigo e na cevada, dependendo das datas de sementeira, serão observadas diversas fases. A fase de emergência e formação inicial das folhas ocorrerá nas culturas de novembro semeadas tardiamente.



Nas culturas cerealíferas de inverno semeadas em outubro, predominará a fase da terceira folha (Bazovets, Silistra, Provadia, Karnobat). Durante o mês, não estão previstas temperaturas mínimas críticas para as culturas agrícolas.



Durante a segunda metade de novembro, não se espera precipitação significativa e as condições permitirão a conclusão das sementeiras de outono, a plantação de árvores de fruto e a realização de atividades fitossanitárias nos pomares.



Durante o mês, deve continuar o monitoramento das culturas de outono para deteção de pragas. No final de outubro, foi constatada uma população aumentada de ratazana-do-campo comum e, em novembro, se a população da praga exceder o limiar económico (mais de 2 colónias ativas por decare), é necessário realizar o tratamento das áreas com os rodenticidas autorizados.