

Durante a primeira metade de maio, haverá condições favoráveis para o desenvolvimento do fundo infeccioso de uma série de doenças fúngicas em culturas agrícolas.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.05.2017 Брой: 5/2017



Precipitações frequentes e localmente intensas no início de maio serão uma precondição para o aumento da pressão de infecção de uma série de doenças fúngicas: fusariose e ferrugens (amarela, marrom) no trigo e na cevada; míldios nas culturas de hortaliças; sarna e mancha bacteriana nas árvores frutíferas; míldio e oídio na videira.

Durante o primeiro decêndio de maio, as condições agrometeorológicas serão determinadas por tempo instável com chuvas frequentes, o que em muitas partes do país dificultará a implementação das atividades

agrotécnicas sazonais – conclusão da sementeira do milho grão, preparo do solo pré-sementeira e sementeira das culturas de primavera termofílicas tardias – feijão, algodão, amendoim, melancias, melões, etc.

Durante este período, o desenvolvimento das lavouras de outono e das culturas de primavera semeadas ocorrerá sob temperaturas médias diárias próximas das normas climáticas e na presença de boas reservas de umidade do solo na camada de 50 cm, acima de 85% da capacidade de campo (CC). Durante o decêndio, no trigo e na cevada nas regiões de campo do país, o estágio de espigamento será observado em massa, e em alguns lugares no sul da Bulgária – o início da floração.

No final do primeiro e início do segundo decêndio, prevê-se um aumento das temperaturas e uma aceleração da vegetação nas culturas agrícolas. Até meados de maio, ocorrerão a floração e a fertilização nas culturas de cereais de inverno, e no milho e girassol – a formação de folhas. Nas culturas de primavera precoces (ervilhaca, ervilha) serão observados o botão floral e a floração.

Nas culturas frutíferas não afetadas pelas geadas de abril, ocorrerá a formação e o aumento do vingamento dos frutos. Na videira, será observada a emergência da inflorescência.

Precipitações frequentes e localmente intensas no início de maio serão uma pré-condição para o aumento da pressão de infecção de uma série de doenças fúngicas: fusariose e ferrugens (amarela, marrom) no trigo e na cevada; míldios nas culturas de hortaliças; sarna e mancha bacteriana nas árvores frutíferas; míldio e oídio na videira. Condições mais adequadas para a realização de pulverizações de proteção de plantas ocorrerão no final do primeiro e na primeira metade do segundo decêndio.

Até meados de maio, não são previstas temperaturas mínimas críticas para as culturas agrícolas. Durante o primeiro decêndio, espera-se uma maior probabilidade de granizo. Em caso de danos por granizo, é aconselhável que as culturas afetadas sejam tratadas na primeira oportunidade com fungicidas à base de cobre para uma cicatrização mais rápida das feridas e para reduzir o risco de infecções secundárias.

Fonte: NIMH-BAS