

Míldio da videira (*Plasmopara viticola*)

Автор(и): Растителна защита
Дата: 08.05.2017 Брой: 5/2017



Dependendo da idade das folhas, o míldio forma dois tipos de manchas: oleosas e em mosaico. Na sua face inferior forma-se um revestimento branco de esporulação. Em ataques severos, as folhas secam e caem prematuramente. Sob condições favoráveis (umidade relativa do ar acima de 75%), aparecem manchas cloróticas nas inflorescências e cachos, sobre as quais também se forma um revestimento branco de esporulação. Quando as manchas estão na base do cacho, o cacho inteiro seca. A infecção das bagas cessa quando, para as variedades de uva para vinho, elas atingem o tamanho de uma "ervilha", e para as variedades de uva de mesa, o tamanho de um "feijão".

Estratégia de controle da praga:

O tratamento é realizado quando ocorrem condições favoráveis para a infecção (temperatura do ar acima de 13°C e chuvas frequentes, mas leves) e durante o estágio fenológico sensível da videira "floração" - "ervilha".

Produtos fitofarmacêuticos autorizados:

acrobate r – 0,25%; acrobate plus wg – 200 g/ha; axanit-cu wp – 0,25%; alial 80 wg - 75-330 g/ha; alfil wg - 0,075-0,33 kg/ha; alfil wp - 0,075-0,33 kg/ha; alfil duplo - 90-350 g/ha; amalin flo - 280 ml/ha; anthracol 70 wg – 0,15%; armetil m – 0,25%; armetil-s wp – 0,25%; banco 500 – 0,2%; calda bordalesa 20 wp – 0,5-0,6%; valbon - 180-200 / ha; verita wg – 0,2%; winker wg – 200 g/ha; vitene triplo r - 400 -450 g/ha; vitra 50 wp /cuprohy 50 wp – 0,15%; galben 8 m 65 – 0,25%; delan 700 wdg – 0,05%; dimix 500 sc - 34 ml/ha aplicado em mistura em tanque com produtos contendo folpet; dimix 500 sc - 30 ml/ha aplicado em mistura em tanque com produtos contendo mancozebe; ditan dg - 200 g/ha; ditan m-45 - 200 g/ha; drago 76 wp – 0,16%; enervin – 0,2%; cabrio top – 0,15%- intervalo de tratamento 7-10 dias - 0,2% a cada 10-14 dias; katanga express - 75-330 g/ha; katanga man - 300-500 g/100 l de água; corseit r df – 0,25%; corseit r wp – 0,25% até 09.2017; corseit max wp – 0,15%; cuadris 25 sc – 0,075%; cupertine m – 0,3%; cuproxat fl / tribase flowable – 0,3% até 06.2017; cuproset gold m – 0,15%; cuprocin super m – 0,2%; lieto - 40-45 g/ha; mancozebe 80 wp – 0,3%; manfil 80 wp - 200 g/ha; manfil 75 wg - 210 g/ha; medeiro 80 wg- 75-330 g/ha; oxicloreto de cobre 50 wp – 0,25%; medyan extra 350 sc - 350 ml/ha; melody compact 49 wg - 150 -175 g/ha até 06.2017; mical flash – 0,3%; mildicut - 350-450 ml/ha; moximat 505 wg - 240-300 g/ha; moximat 505 wp - 240 – 300 g/ha; momentum extra wg - 300 g/ha; pasodoble 70 wg - 200 g/ha; pencozeb 80 wp - 200 g/ha; pencozeb 75 wg - 210 g/ha; pergado copper 27 wg - 500 g/ha; pergado f 45 wg – 0,2%; profiler 71.1 wg- 200-225 g/ha; ridomil gold mz 68 wg – 0,25%; rumba 35 sc – 0,35%; sancozeb 80 wp - 200 g/ha; sinstar - 70-80 ml/ha; solofol - 188 g/ha; strobilurin df /discus df - 0,015 % +acrobate mz - 0,15 %; sphinx extra /vinostar - 180 g/ha; folder 80 wg - 150 g/ha; follow 80 wg/ friller 80 wg/ flowet 80 wg - 187,5 g/ha; folpan 80 wdg - 0,15 % - 0,1 % +ardent 50 sc - 0,015 %; funguran oh 50 wp – 0,15%; shavit f 72 wdg – 0,2%; champion wp/ makk 50 wp /champ wp – 0,155.