

Em junho, as condições meteorológicas serão favoráveis ao desenvolvimento de doenças fúngicas

Автор(и): Растителна защита

Дата: 05.06.2017 Брой: 6/2017



Em junho, as condições meteorológicas serão favoráveis ao desenvolvimento de uma série de doenças fúngicas: míldio nas videiras e culturas hortícolas, podridão parda tardia nos frutos das variedades tardias de cereja, rachaduras nos frutos em pomares, etc. Condições mais adequadas para a realização de pulverizações de proteção das plantas ocorrerão no início da primeira, durante a segunda metade da segunda e na maioria dos dias da terceira década do mês. Durante o mês, as temperaturas máximas previstas, em torno de 34-35°C, terão um impacto negativo na floração e fertilização das culturas hortícolas.

No início de junho, o desenvolvimento das culturas agrícolas prosseguirá em ritmo acelerado, sob temperaturas acima do normal e, na maior parte do país, com boas e muito boas reservas de humidade do solo como

resultado das precipitações significativas durante a terceira década de maio (Vratsa – 57 l/m², Lovech – 41 l/m², Pleven - 106 l/m², Veliko Tarnovo - 74 l/m², Svishtov – 68 l/m², Ruse – 51 l/m², Silistra – 48 l/m²). Exceções serão observadas apenas em locais isolados das regiões sul e sudeste, onde a precipitação não teve significado económico particular, abaixo de 10 l/m².

Em meados da primeira década, está prevista uma diminuição e normalização das temperaturas e uma alteração das condições agrometeorológicas. A precipitação esperada até ao final da primeira década manterá as reservas de humidade do solo dentro de intervalos ótimos para a vegetação das culturas de primavera. Também terá um efeito benéfico nas culturas de cereais de inverno nos campos mais altos, onde ocorrerá o enchimento do grão. No trigo das regiões de planície do país, será observada a fase de maturação leitosa. Na cevada, ocorrerá a transição da maturação leitosa para a cerosa e a maturação cerosa. Durante a primeira década, a colza entrará na fase de maturação. Durante este período, está prevista uma maior probabilidade de granizo, com risco de acamamento das culturas e danos adicionais às culturas agrícolas. Em caso de danos por granizo, recomenda-se que as culturas hortícolas e frutícolas afetadas sejam tratadas na primeira oportunidade com fungicidas apropriados (contendo cobre).

Durante a maioria dos dias da segunda e terceira décadas, o desenvolvimento das culturas agrícolas prosseguirá a temperaturas próximas da norma. No início da segunda década, nas áreas de campo, a cevada estará predominantemente na fase de maturação em massa. No final da década, o trigo estará predominantemente na fase de maturação cerosa.

Até ao final de junho, algumas das culturas de primavera entrarão em fases reprodutivas do seu desenvolvimento: no girassol, será observado o início da floração, e nos híbridos precoces de milho – o emborrachamento e a floração da espiga. Durante o mês, as temperaturas máximas previstas, em torno de 34-35°C, terão um impacto negativo na floração e fertilização das culturas hortícolas.

Fonte: NIMH - BAS