

Práticas de proteção de plantas em junho para vinhedos

Автор(и): гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 13.06.2017 Брой: 6/2017



Neste período, as videiras estão da fenofase "floração plena" até a fenofase "baga do tamanho de uma ervilha" - "fechamento do cacho"

Principais pragas para o período

Mildio da videira *Plasmopara viticola*

Oídio *Oidium tuckeri*

Podridão cinzenta *Botrytis cinerea*

Traça-da-uva *Lobesia botrana*

Cochonilha da videira *Pulvinaria vitis*

Ácaro amarelo da videira *Schizotetranychus viticola*

Podridão cinzenta

Na fenofase "*floração plena*", formam-se manchas castanhas nas flores e pedicelos florais, que são cobertos pela esporulação do patógeno. Estes sintomas são conhecidos como podridão cinzenta precoce.

Estratégia de controle da praga: Em tempo chuvoso e quente, imediatamente após a floração, no aparecimento das primeiras bagas e no fechamento do cacho, é realizada uma pulverização com um dos produtos fitofarmacêuticos registrados.

Produtos fitofarmacêuticos autorizados: arvak 50 WG - 100-150 g/ha; geox WG - 100 g/ha; driza WG - 100-150 g/ha; cabrio top – 0.2%; cantus - 100 g/ha; mevalon - 160-400 ml/ha; proletus 50 WG - 120 g/ha; rebut WG - 100-150 g/ha; sabueso - 100-150 g/ha; synpro - 150 ml/ha; switch 62.5 WG - 0.08%; thiram 80 WG – 0.4%; top plus 70 WP – 0.1%; topsin M 70 WDG – 0.1%; folder 80 WG - 150 g/ha; follow 80 WG / friller 80 WG / flowet 80 WG - 187.5 g/ha; folpan 80 WDG - 0.1 % + ardent 50 SC - 0.015 %; shavit F 72 WDG – 0.2%.

Traça-da-uva

Em junho, voam as borboletas da segunda geração da praga. Elas depositam os seus ovos em bagas do tamanho de uma ervilha (primeiras bagas). As larvas danificam as primeiras bagas, roendo e comendo o interior das bagas juntamente com as sementes. As bagas danificadas são fracamente ligadas por fios de seda. Uma larva danifica de 7 a 24 bagas.

Estratégia de controle da praga: Os tratamentos devem ser realizados no **Nível Económico de Ataque (NEA)**: para variedades de uva de mesa 6-7 larvas por 100 primeiras bagas, e para variedades de uva para vinho 11-12 larvas por 100 primeiras bagas.

Produtos fitofarmacêuticos autorizados: aficar 100 EC – 40 ml/ha; dascor 440 - 50 ml/ha; decis 100 EC - 12.5-17.5 ml/ha; dipel 2 X - 0.1 %; dukat 25 EC - 70 ml/ha; efcimetrin 10 EC / cyper 10 - 40 ml/ha; karate zeon 5 CS – 0.02%; coragen 20 SC - 18 ml/ha; luzindo 40 WG - 0.025 kg/ha; mageos - 10 g/ha; maltoato - 40-60 ml/ha; nexcid 015 CS - 0.03 %; nurelle D / chlorsirin 550 EC / samba - 60 ml/ha; runner 240 SC - 0.04 %; rapax - 75-100 ml/ha; reldan 40 EC - 0.12 %; sineis 480 SC - 4-18 ml/ha; sumi alpha 5 EC / sumicidin 5 EC - 0.025 %; forey 48 B - 0.15 %; fury 10 EC - 0.0125 %; ciklon 10 EC - 40 ml/ha; cyperfor 100 EC - 40 ml/ha; citrin max / cyperkyl 500 EC / cypert 500 EC / poli 500 EC - 6 ml/ha; sherpa 100 EW / aficar 100 / cyperfor 100 EW / ciklon 100 EW - 25 ml/ha; sherpa 100 EC - 40 ml/ha.