

Cuidados com a proteção das plantas em julho nos vinhedos

Автор(и): гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 06.07.2017 Брой: 7/2017



Durante este período, as videiras encontram-se no estágio fenológico entre o "fim da floração" e o "início do amadurecimento das bagas" nas variedades precoces.

Principais pragas para o período

Mildio da videira *Plasmopara viticola*

Oídio *Oidium tuckeri*

Podridão cinzenta *Botrytis cinerea*

Cancro bacteriano *Agrobacterium vitis*

Traça-da-uva *Lobesia botrana*

Traça da videira *Theresimima ampelophaga*

Cochonilha da videira *Pulvinaria vitis*

Ácaro amarelo da videira *Schizotetranychus viticola*

Cancro bacteriano

Em plantas infectadas nas partes lenhosas, próximas à superfície do solo ou imediatamente abaixo dela, observam-se inchaços (tumores). As plantas doentes apresentam crescimento suprimido, folhas cloróticas e são facilmente danificadas pelo frio durante um inverno rigoroso.

Estratégia de controle da praga:

Em julho, as videiras que apresentarem sintomas da doença devem ser marcadas.

Cochonilha da videira

A eclosão das larvas continua durante a primeira quinzena de julho. Elas causam danos ao sugar a seiva das folhas, brotos e cachos de uva. Elas mudam uma vez, alimentam-se por um certo período e depois deixam os locais de alimentação e se deslocam para seus locais de hibernação. Como resultado dos danos, as videiras ficam enfraquecidas.

Estratégia de controle da praga:

O controle químico é realizado contra as larvas jovens.

Produto fitossanitário autorizado:

movento 100 sc - 0,075-0,095%;

